

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE ORTICOLE

Bollettino n. 05 del 12/02/2025

RADICCHI CAMPAGNA 2024

Si stanno ultimando le raccolte di radicchio in campo. Dopo le condizioni metereologiche di questi ultimi giorni caratterizzate piogge e temperature miti il materiale in raccolta potrebbe avere forti attacchi di batteriosi specialmente vicino al cuore, pertanto prima di stoccare il prodotto si consiglia di pulire bene le piante dalle foglie colpite dalla malattia oppure eliminare le piante stesse per non compromettere le piante sane.

Ultimate le raccolte, appena le condizioni climatiche e il terreno lo permettono (terreno abbastanza asciutto e giornate assolate) è conveniente effettuare una ripuntatura o dissodatura per arieggiare il terreno e ultimare lo sgrondo delle acque superficiali visto il forte costipamento del terreno creato durante la raccolta.

PATATA

Sono iniziati i ritiri e le consegne delle patate da seme. La sanità dei tuberi costituisce l'elemento principale per limitare o ridurre patologie (batteriosi, virosi e funghi) che possono compromettere la produzione durante lo sviluppo vegetativo. Controllare pertanto, sempre, lo stato fitosanitario dei tuberi prima della consegna o ritiro con verifiche a campione su diversi sacchi (dello stesso lotto) a seconda dell'entità della partita. Per evidenziare al meglio le malattie fungine superficiali (Rizoctonia, Scabbia e Fusarium) i tuberi vanno lavati e successivamente tagliati per verificare eventuali alterazioni interne causate da batteriosi o fisiopatie. Tenere sempre divisi i tuberi per varietà, classe, numero di lotto, pezzatura e conservarli in locali asciutti, areati con temperatura tra i 6° e 10°C. Temperature inferiori ai 2° C, per un periodo di 2-3 giorni, danneggiano in particolare i germogli, compromettendoli. Se i tuberi vanno tagliati, non produrre pezzi inferiori ai 30 grammi di peso e favorire una buona cicatrizzazione prima dell'impianto. Maneggiare le patate con molta delicatezza, sia nello scarico che nel trasporto, per ridurre ammaccature e lesioni che facilitino l'instaurarsi di marciumi ed evitare in maniera assoluta la conservazione dei tuberi in sacchi accatastati per lungo tempo. Conservare i cartellini dei tuberi-seme per l'intera stagione.

TRAPIANTI DI LATTUGA E CAVOLO CAPPUCCIO IN SERRA

Con le condizioni atmosferiche attuali si consiglia di arieggiare le serre, ridurre il più possibile le irrigazioni in particolare quelle aeree e se la coltura è trapiantata da più di un mese effettuare una prima zappatura/sarchiatura. I trapianti di circa un mese non necessitano di nessun intervento fitosanitario, mantenere comunque il monitoraggio di eventuali insetti presenti.