

## BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

### COLTURE ORTICOLE

*Bollettino n. 08 del 06/03/2025*

#### FRAGOLA IN SERRA

Nella fase di accrescimento pianta e sulle varietà precoci, si iniziano a vedere i primi abbozzi fiorali. Si notano alcuni focolai di ragnetto rosso; dove non ci sono grosse pressioni attendere l'innalzamento delle temperature per eseguire i lanci del predatore *Phytoseiulus persimilis*, mentre dove i problemi sono maggiori e la presenza può danneggiare la pianta, intervenire con prodotti acaricidi, compatibili con eventuali lanci futuri, miscelando un prodotto ad azione adulticida con uno ad azione ovicida (exitiazox). Gli attacchi di botrite che si notavano la settimana scorsa sono in fase di regresso grazie al tempo soleggiato e asciutto; in caso contrario arieggiare ulteriormente le serre.

#### LATTUGHE IN SERRA

Nella stagione in corso sono quasi del tutto assenti attacchi di bremia, mentre si nota qualche problema con sclerotinia e botrite. È bene quindi arieggiare le serre ed eventualmente intervenire con antibotritici specifici come riportato nelle Linee Tecniche di Difesa Integrata della Regione Veneto (<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata>). In conseguenza di un aumento di *Fusarium spp.*, si raccomanda l'uso di varietà tolleranti/resistenti. Attenzione ad eventuali focolai di afide; se presenti intervenire con prodotti riportati nelle Linee Tecniche di Difesa Integrata della Regione Veneto (porre attenzione ai cambi di etichetta dei prodotti a base di acetamiprid a seguito dei cambiamenti dei LMR sulla coltura).

#### CETRIOLO/POMODORO/ZUCCHINO/MELANZANE/MELONE IN SERRA

Sono iniziati i trapianti delle suddette colture, non si segnalano attualmente problemi particolari, ma si consiglia di porre attenzione alle basse temperature notturne. Nella gestione delle irrigazioni evitare la formazione di ristagni che, in questa fase molto delicata, possono causare la moria delle giovani piantine (*Pithyium spp.*).

#### CAVOLFIORE E CAVOLO CAPPUCCIO IN SERRA

Per i trapianti effettuati nel mese di gennaio e i primi giorni di febbraio, viste le condizioni climatiche, si consiglia di eliminare definitivamente il tessuto non tessuto, effettuare eventuali lavorazioni nell'interfila, controllare il buon funzionamento delle manichette e arieggiare le serre il più possibile. Verificare la possibile presenza di peronospora e di limacce specialmente nelle file esterne. In caso di accertata presenza di peronospora intervenire con i prodotti indicati nelle Linee di Difesa Integrata della Regione Veneto.

**BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA**

**CETRIOLO IN SERRA**

Prestare molta attenzione a possibili focolai di afidi: nei trapianti precoci che sono prossimi alla raccolta si consiglia, pertanto, di effettuare un primo lancio di insetti utili (*Chrysoperla carnea* alla dose di 10 individui mq con l'aggiunta di 1 individuo mq di *Aphidius colemani*); negli impianti dove la raccolta non è ancora iniziata, qualora si riscontri già la presenza di afidi, effettuare un intervento con prodotti indicati nelle Linee di Difesa Integrata della Regione Veneto, preferendo principi attivi con poca persistenza a tutela degli insetti utili e successivamente, dopo una settimana, introdurre gli insetti utili.