

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA**COLTURE ORTICOLE***Bollettino n. 13 del 09/04/2025***FRAGOLA IN SERRA – area Veneto occidentale (VR)**

Negli impianti tradizionali (suolo) sono iniziati in questi giorni i primi stacchi mentre nelle colture in fuori suolo siamo nella fase di ingrossamento frutto. Non si segnalano particolari problemi dovuti a malattie fungine se non qualche caso di botrite sui frutti dove non è stata gestita in maniera oculata l'areazione della serra o su varietà particolarmente sensibili. Sotto controllo il ragnetto rosso ed il tripide dove sono stati effettuati i lanci dei rispettivi predatori. Sono in aumento le colonie di afide, valutare un eventuale immissione di parassitoidi specifici.

LATTUGA IN SERRA – area Veneto occidentale (VR)

Siamo ormai nella fase conclusiva degli ultimi impianti in serra e non si notano particolari problemi sanitari, continuare il monitoraggio dei principali insetti fitofagi più pericolosi del periodo come gli afidi ed i tripidi.

MELONE IN SERRA – area Veneto occidentale (VR)

Specialmente su varietà precoci, è iniziata la fase di allegagione che al momento prosegue senza grossi problemi.

CETRIOLO IN SERRA

Sono comparsi i primi attacchi di afide, valutare quindi un eventuale lancio di predatori specifici o se necessario un intervento con le sostanze attive indicate nelle linee tecniche di difesa integrata della regione Veneto

ZUCCHINO IN AMBIENTE PROTETTO

Le piante stanno iniziando l'accrescimento dei frutti, ma a causa dell'andamento climatico dell'ultimo periodo (temperature notturne molto basse) e lo scarso vigore vegetativo, i frutti si presentano di un verde molto intenso, deformi e con pezzatura ridotta. In queste situazioni si consiglia di asportare tutti i frutti per dare vigoria alla pianta e alimentare le nuove zucchine. Soprattutto nelle serre, controllare periodicamente sulla pagina inferiore la presenza di afidi.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

MELANZANA IN SERRA

Si notano i primi focolai di tripidi sulle piante trapiantate da 20-25 giorni, se l'attacco non è molto forte, si può intervenire con lanci di insetti utili nello specifico *Amblyseius swirskii* alla dose di almeno 50 individui mq con l'aggiunta di *Orius leavigatus* 1 individuo mq.

POMODORO IN SERRA

I trapianti effettuati da circa 15-20 giorni sono in pieno accrescimento, non sono ancora presenti i primi fiori e le piante non evidenziano nessun sintomo di malattie fungine. Sono iniziati i primi monitoraggi di *Tuta absoluta*, in questo periodo si consiglia di collocare all'interno della serra i dispenser per la confusione sessuale.

CAVOLFIORE E CAVOLO CAPPuccio IN SERRA

Si nota la presenza di peronospora, pertanto, si consiglia di arieggiare il più possibile le serre, moderare le concimazioni azotate e favorire il drenaggio del suolo; dov'è necessario, intervenire con principi attivi indicati nelle linee tecniche di difesa integrata della regione Veneto avendo cura di verificare se il prodotto commerciale sia autorizzato in coltura protetta.