

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE ORTICOLE

Bollettino n. 14 del 16/04/2025

FRAGOLA IN SERRA – area Veneto occidentale (VR)

Prosegue a rilento la raccolta dei primi frutti nelle coltivazioni in suolo ed è iniziata anche la maturazione nelle coltivazioni fuori suolo.

Con le condizioni meteo previste porre attenzione ad eventuali attacchi di *Botrytis cinerea*, cercare di limitare le condizioni favorevoli di sviluppo della malattia gestendo correttamente l'apertura delle serre e solo in casi gravi o su varietà estremamente sensibili valutare un eventuale intervento con prodotti specifici come indicato dalle linee tecniche di difesa integrata della regione Veneto, ponendo la massima attenzione al periodo di carenza.

In diverse situazioni aziendali si notano attacchi oltre soglia di afide verde nelle quali quindi si consiglia di attuare una difesa con predatori specifici.

Si sono rilevati anche focolai sporadici di ragnetto rosso, nei casi più gravi intervenire con lanci localizzati integrativi di *Phytoseiulus persimilis*.

MELONE IN SERRA

Nell'area Veneto occidentale prosegue senza particolari problemi la fase di allegagione. Date le condizioni di elevata umidità, gestire in maniera corretta le aperture delle serre per evitare attacchi di malattie fungine come *Pseudoperonospora cubensis* e *Didymella bryoniae*.

Nell'area orientale della regione si riscontra un ritardo di qualche giorno sullo sviluppo vegetativo, in alcuni casi si è notata la presenza di afide, pertanto accertata la reale presenza e prima di posizionare arnie di bombi o nuclei di api a perdere per l'impollinazione, si consiglia di intervenire con prodotti a base di flonicamid o spirotetramat (quest'ultima sostanza attiva è stata revocata e l'utilizzo è consentito fino al 30/10/2025), intervenendo alla mattina in giornate soleggiate. A distanza di qualche giorno dal trattamento si possono introdurre i pronubi per l'impollinazione.

POMODORO IN SERRA

Su pomodoro trapiantato precocemente siamo nella fase di allegagione del 2/3 palco fiorale e non si notano particolari problemi sanitari.

Con le condizioni atmosferiche attuali, si consiglia di tenere il più possibile le serre aperte per mantenere una pianta asciutta, riducendo al minimo le condizioni per lo sviluppo di infezioni peronosporiche. Alla comparsa dei primi sintomi si consiglia di intervenire con uno dei principi attivi indicati nelle Linee di difesa integrata della regione verificando che il prodotto commerciale sia

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

autorizzato in serra. In questa fase posizionare le trappole cromotropiche gialle per il monitoraggio dell'aleurodide (mosca bianca).

Sui nuovi impianti valutare l'applicazione del metodo di confusione sessuale per contrastare le popolazioni previste di *Tuta absoluta* rispettando l'indicazione come da etichetta.

CAVOLO CAPPUCCIO IN PIENO CAMPO

Si riscontra la presenza di larve di cavolaia nella pagina inferiore delle foglie, con le prime rosure delle foglie e le larve presenti intervenire con uno dei principi attivi indicati nelle linee tecniche di difesa integrata della regione Veneto.

PATATE

Siamo in pieno germogliamento dei tuberi di patata. In questa fase la coltura non necessita di alcun trattamento.

ASPARAGO IN ALLEVAMENTO

Nei nuovi impianti, in particolare quelli al secondo anno che presentano vegetazione superiore al metro di altezza, viste le condizioni atmosferiche, prestare molta attenzione a possibili attacchi di stemfiliosi (*Stemphylium vesicarium*) alla base dei turioni; nel caso in cui si riscontrassero le prime pustole intervenire con i principi attivi indicati nelle linee tecniche di difesa integrata della regione Veneto.