

## BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

### COLTURE ORTICOLE

*Bollettino n. 01 del 15/01/2025*

#### AGGIORNAMENTO PRODOTTI FITOSANITARI

Dal 11 dicembre 2024 sono entrati in vigore i **nuovi livelli massimi di residuo per la s.a.**

**DELTAMETRINA**, fissati con il Regolamento (UE) 2024/1342 del 21 maggio 2024.

Su alcune colture il residuo massimo è stato portato a 0,01mg/kg che rappresenta il limite inferiore di determinazione analitica e, a fini pratici, significa che la sostanza non deve essere presente/rilevata in fase di controllo e pertanto si è reso necessario revocare l'autorizzazione su alcune colture, tra le quali:

- Carciofo, Cavoli cappuccio, Kiwi, Scarola, Semi di girasole.

Revocato impiego anche su (rientrano nel gruppo della Scarola):

- Indivia riccia, Cicorie comuni, Puntarelle, Radicchi, Cicorie pan di zucchero.

Non sono previsti periodi di smaltimento dei vecchi prodotti fitosanitari autorizzati su queste colture.

**Revocate invece definitivamente alcune sostanze attive** per scadenza autorizzazione (ma dove è previsto un periodo per lo smaltimento dei formulati commerciali), tra cui:

- s.a. **DIMETOMORPH**- scadenza impiego al 20 maggio 2025. Fungicida per il controllo della peronospora presente in 80 prodotti fitosanitari e autorizzato su circa 35 colture tra orticole, vite e floreali.
- s.a. **MEPANIPYRIM** – scadenza impiego al 20 maggio 2025. Fungicida per il controllo della botrite su fragola, vite e floreali
- s.a. **SPIROMESIFEN** -scadenza impiego 31 marzo 2025. Insetticida per il controllo del ragnetto rosso e aleurodidi e autorizzato su 10 colture orticole.

*Le etichette dei diversi prodotti fitosanitari contenenti le sostanze sopra indicate, sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nella sezione "Banca Dati".*

#### ASPARAGO

Sia su asparago bianco che su verde iniziare, terreno permettendo, la pulizia da infestanti per ottimizzare la predisposizione della baulatura, pacciamatura e/o forzatura. Nelle lavorazioni meccaniche non superare i 5 cm di profondità se si interviene sulla fila considerando che le zampe

## **BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA**

tendono a portarsi verso la superficie in quanto le radici vivono mediamente tre anni e se ne formano di nuove anno dopo anno nella parte più alta. Due, tre centimetri è l'aumento in altezza/anno.

In caso di danni da mosca o elateridi, rilevati nella passata produzione, si potrà utilizzare la CALCIOCIANAMIDE, concime azotato che nelle prime fasi di trasformazione in azoto ammoniacale libera la CIANAMIDE, sostanza caustica in grado di contenere la presenza di alcuni funghi del terreno (*Fusarium, Rizoctonia...*), inibire la germinazione dei semi infestanti e allontanare/danneggiare gli insetti che arrivano a contatto del concime. Nessun geodisinfestante di sintesi risulta ad oggi autorizzato per l'impiego su asparagiaie dopo l'impianto

Sul bianco la pacciamatura controlla le infestanti e pertanto non è necessario impiegare prodotti diserbanti, rinviando gli interventi in post raccolta.

Appena le condizioni climatiche si saranno stabilizzate, possibili invece i diserbi sul verde con METRIBUZIN (s.a. revocata: utilizzo entro 24 novembre 2025).

*PROSSIMO BOLLETTINO mercoledì 22 gennaio 2025*