

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE ORTICOLE

Bollettino n. 17 del 07/05/2025

FRAGOLA IN SERRA

La settimana scorsa si è raggiunto il picco della raccolta, accelerato anche dall'improvviso innalzamento delle temperature: in questa fase porre attenzione a non esagerare con le irrigazioni o con concimazioni eccessive onde evitare una ridotta consistenza dei frutti e la conseguente scarsa conservabilità. Per ovviare a questo, su varietà particolarmente delicate, si può intervenire con prodotti a base di calcio.

La presenza di tripide e di ragnetto rosso risultano sotto controllo, grazie ai precedenti lanci di predatori specifici, mentre sono in aumento i sintomi da attacchi di oidio ed in questi casi valutare un intervento con le sostanze attive indicate nelle linee tecniche di difesa integrata della regione Veneto.

FRAGOLA IN PIENO CAMPO

Siamo ad inizio/piena raccolta. Considerando le condizioni atmosferiche attuali e dei prossimi giorni, si consiglia di effettuare un intervento contro la muffa grigia (*Botrytis cinerea*) con *Bacillus amyloliquefaciens* o *Bacillus subtilis* o *Pythium oligardrum*, rispettando ovviamente le indicazioni presenti in etichetta.

CETRIOLO IN SERRA - AREA VENETO OCCIDENTALE (VR)

In alcune varietà, si notano le prime macchie di *Pseudoperonospora cubensis*, dovute probabilmente oltre che dal tasso elevato di umidità anche dall'accrescimento della vegetazione perciò favorire al massimo l'aerazione all'interno delle serre.

MELANZANA IN SERRA

La presenza di dorifora è in aumento: dove necessario intervenire con sostanze attive indicate nelle linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto.

POMODORO IN SERRA

Porre attenzione a possibili attacchi di afide verde, in caso di forte infestazione generalizzata si può intervenire con prodotti a base di Flonicamid, avendo cura di chiudere le arnie di bombi per 1 giorno. In caso di poca presenza effettuare lanci di *Aphidius colemani* alla dose di 1 individuo mq.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ZUCCHINO IN SERRA

I trapianti sono tutti in piena raccolta e le condizioni sono favorevoli a possibili focolai di afidi, pertanto si consiglia di effettuare un lancio di insetti utili quali *Chrysoperla carnea* alla dose di 10 individui mq con l'aggiunta di 1 individuo mq di *Aphidius colemani*. Non si segnala ancora presenza di Oidio.

CAVOLO CAPPuccio

In molti areali si nota la forte presenza di tignola delle crucifere (*Plutella xylostella*) micro lepidottero di 12-16 mm di apertura alare, gli adulti si presentano di colore marrone tendente al grigiastro con antenne pronunciate. Il suo danno non è da sottovalutare, in quanto, inizialmente le larve vivono all'interno delle foglie per poi portarsi sulla pagina inferiore, dove si nutrono dei tessuti della lamina fogliare senza però perforare totalmente le foglie. Con presenza di larve e prime rosure si consiglia intervenire con uno dei principi attivi indicati nelle linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto. L'impiego di trappole a feromoni permette di individuare l'inizio del volo dell'insetto e il numero di generazioni il quale può arrivare a compiere anche 7 generazioni all'anno in presenza di elevate temperature.

LATTUGA IN PIENO CAMPO

Prestare attenzione a possibile presenza di afide specialmente nelle foglie vicino al cuore, con presenza intervenire con i principi attivi indicati nelle Linee di difesa integrata della Regione Veneto.