

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA**COLTURE FRUTTICOLE***Bollettino n. 02 del 26/02/2025***FASI FENOLOGICHE**

Specie	Verona/Vicenza/Rovigo/Padova	Venezia/Treviso
Albicocco	In generale bottone rosso. Alcune varietà presentano già la corolla visibile.	Le varietà più precoci sono a bottone rosso.
Susino	Varietà cino-giapponesi: bottone verde. Varietà europee: gemma gonfia.	Bottone bianco.
Pesco	Gemma gonfia/rottura di gemme a legno.	Gemma gonfia/bottone rosa in funzione della precocità.
Pero	Gemma d'inverno (gemma mossa).	Gemma mossa, soprattutto su Abate.
Melo	/	Granny Smith: gemme gonfie.
Actinidia	Hayward: gemma ferma. Varietà gialle: gemma ingrossata.	Fase di riposo vegetativo
Noce	/	Fase di riposo vegetativo

ALBICOCCO E SUSINO

Corineo e Batteriosi: trattamento con sali di rame in formulazione dispersa prima delle piogge. Per corineo aggiungere captano (solo su susino è possibile impiegare anche ziram).

Cocciniglia di San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*): nelle situazioni con presenza del fitofago, a gemme ingrossate (e poco oltre) impiegare olio minerale invernale, ed in fase di pre fioritura pyriproxifen.

PESCO

Con gemma rotta, ed in presenza di pioggia, inizia il periodo di sensibilità alla bolla. Sulle foglioline presenti in varietà molto precoci e non trattate con puntualità durante l'inverno si vedono i sintomi di bolla.

Batteriosi: trattare con sali di rame;

Bolla e corineo: trattare con captano, dodina, ziram;

Cocciniglia di San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*): nelle situazioni con presenza del fitofago, a gemme ingrossate (e poco oltre) impiegare olio minerale invernale, ed in fase di pre fioritura pyriproxifen.

Tripidi: se si sono riscontrati danni nell'annata precedente utile l'impiego di piretroidi, nella fase di bottoni rosa avanzata.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

MELO

Afide lanigero: nei frutteti con presenza di afide lanigero e cocciniglia si consiglia di utilizzare in questo periodo olio minerale o in prodotti già in miscela con zolfo cercando di bagnare bene e con buona pressione le piante.

Nectria: interventi pre e post potatura con prodotti rameici sono fondamentali per contrastare cancri e disseccamenti rameali.

PERO

Le varietà estive presentano in generale una scarsa quantità di gemme a fiore; nelle William e Conference riscontriamo una carica gemmaria leggermente inferiore rispetto alla precedente annata. Ottima la presenza di gemme a fiore sulle varietà più tardive come Abate, Kaiser e Fred.

Cancro rameale: trattamento con sali di rame in pre e post potatura per contrastare la necrosi batterica delle gemme e i cancri rameali da nectria.

Maculatura bruna: su Abate e Conference (con danni rilevanti negli ultimi anni) programmare e provvedere alla prima rottura del cotico interfilare.

Eriofide vescicoso: nella fase di rottura gemme trattate con prodotti a base di zolfo.

Psilla: per ridurre l'ovideposizione della psilla utili un'applicazione di caolino. Da ripetere successivamente in post fioritura/allegagione.

ACTINIDIA

PSA: già qualche presenza, per ora sporadica su impianti vecchi. In pre e post potatura trattare con sali di rame. Sulle ferite, da dove fuoriesce l'essudato, la spennellatura con grassello di calce può contenere con buoni risultati la diffusione del batterio.

Cocciniglia: dove riscontriamo una forte presenza di cocciniglia sui cordoni ed il fusto principale, intervenire con prodotti contenenti olio e zolfo già in miscela e pronti all'uso.

NOCE

Noceti adulti: proseguono le potature meccaniche e la trinciatura della legna

Noceti giovani: iniziate le potature di formazione delle piante.

Sia nei giovani impianti che su quelli in produzione si riscontrano le classiche lesioni da Batteriosi dovute alle intense e prolungate piogge della scorsa primavera.

L'accumulo di ore di freddo alla data odierna è leggermente superiore allo scorso anno, sufficienti per un corretto germogliamento e fioritura delle piante.