

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 03 del 06/03/2025

ALBICOCCO

La coltura è ormai prossima alla fioritura o in fioritura, con situazioni diverse a seconda delle zone, del terreno e dell'età dell'impianto.

Monilia: trattare prima delle piogge con un prodotto specifico ad azione anti-monilia.

Corineo: per il controllo di questo patogeno e nelle situazioni ritenute a rischio aggiungere al trattamento anti-monilia anche captano.

Cocciniglie, afidi, anarsia: se ancora a bottoni rosa, possibili gli interventi suggeriti per il pesco.

PESCO

A fase fenologica è compresa tra bottoni rosa e inizio fioritura, in funzione della varietà e delle condizioni microclimatiche e pedologiche del frutteto.

Cocciniglie: nelle varietà ancora allo stadio di bottoni rosa è ancora possibile il trattamento con pyriproxifen.

Bolla, monilia, corineo: trattare prima delle piogge con i prodotti previsti nelle LTDI aggiungendo, dove il patogeno è presente con una pressione elevata, una sostanza attiva anche nei confronti di monilia.

Afidi: nelle varietà nella fase di bottoni rosa posizionare l'aficida avendo cura di bagnare bene la vegetazione.

Anarsia: dove è stata verificata la presenza nella stagione passata, unire al trattamento pre-fiorale un insetticida specifico, come indicato nelle LTDI, come *Bacillus thuringiensis*.

Tripidi: se si sono riscontrati danni nell'annata precedente utile l'impiego di piretroidi, nella fase di bottoni rosa.

MELO

Fase fenologica da gemma gonfia a punte verdi.

Ticchiolatura: il primo volo ascosporico si è già verificato, segno che il potenziale di inoculo della malattia ha raggiunto la maturità. Le prossime piogge potranno dare origine alla prima infezione della stagione. Tuttavia, data la limitata superficie ricettiva, il rischio è da considerarsi limitato: è sufficiente una copertura preventiva con un prodotto rameico da fare immediatamente prima della pioggia. Utile l'aggiunta di zolfo per il controllo dello sviluppo dell'oidio.

Cancri rameali: anche in considerazione delle attuali condizioni meteo molto favorevoli alle infezioni da nectria è opportuno un trattamento con sali di rame

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

PERO

Fase fenologica tra gemma tigrata e gemma aperta.

Eriofidi/cocciniglie: se ancora nella fase di "gemma tigrata" è possibile utilizzare olio minerale paraffinico.

Nei confronti dell'eriofide anche solo l'uso di zolfo è efficace per contenere le infestazioni.

Cancri rameali: anche in considerazione delle attuali condizioni meteo molto favorevoli alle infezioni da nectria è opportuno un trattamento con sali di rame.

Psilla: per ridurre l'ovideposizione di questo fitofago è utile un'applicazione di caolino. Da ripetere successivamente in post fioritura/allegagione.

Ticchiolatura: vale quanto detto per il melo.

ACTINIDIA

Si è raggiunto lo stadio di gemma cotonosa.

PSA: terminate le operazioni di potatura e legatura, e in previsione di una pioggia, è opportuno un trattamento preventivo con sali di rame, prima della pioggia.