

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 04 del 13/03/2025

ALBICOCCO

FASE FENOLOGICA: piena fioritura

Monilia: condizioni climatiche molto favorevoli alle infezioni. Proseguire con i trattamenti: alternare le sostanze attive in base al MoA (*Mode of Action* - meccanismo d'azione). In agricoltura biologica si possono usare prodotti a base di bicarbonato di potassio. L'impiego di fungicidi in fioritura è consentito a condizione che non siano presenti in etichetta indicazioni sfavorevoli nei confronti delle api/altri insetti pronubi.

SUSINO

FASE FENOLOGICA: inizio fioritura per le varietà cino-giapponesi: bottoni florali più o meno separati per le varietà europee (ad es.: Stanley, Presidente)

Monilia: nelle varietà cino-giapponesi attuare la difesa come per Albicocco.

Afidi: per le varietà europee è il momento di intervenire con un trattamento specifico.

Cocciniglia: in concomitanza, per i frutteti con problemi di cocciniglia, utile un trattamento con pyriproxyfen.

PESCO

FASE FENOLOGICA: inizio fioritura/fioritura avanzata a seconda delle varietà

Monilia: vedi indicazioni per Albicocco.

Bolla: continuare la difesa (mantenere la copertura)

CILIEGIO

FASE FENOLOGICA: gemme gonfie/rottura gemme a seconda delle varietà e della zona.

Batteriosi: considerate le precipitazioni registrate e quelle previste per il fine settimana, programmare l'applicazione di un prodotto rameico.

MELO

FASE FENOLOGICA:

- Veneto est (Venezia/Treviso): rottura gemme/punte verdi. Granny smith si trova a punte verdi avanzato;
- Veneto ovest (Verona, Rovigo, Padova, Vicenza): gruppo Pink e Granny Smith praticamente già ad orecchiette di topo. Gruppo Gala, Regalyou e Golden punte verdi. Fuji e gruppo Imperatore tra ingrossamento gemme e rottura gemme.

Ticchiolatura: presenza di infezioni importanti, anche se limitate dalla poca superficie recettiva. Intervenire con sali di rame, oppure con ditianon nelle varietà ad una fase fenologica più avanzata. Dove ancora possibile, abbinare oli bianchi (per cocciniglie) al rame.

Nectria: condizioni molto favorevoli alle infezioni. Nella difesa anti-ticchiolatura preferire rame o ditianon.

Afide lanigero: in alcune zone (Veneto est) si segnala la presenza generalizzata di colonie.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

PERO

FASE FENOLOGICA: diversa a seconda della varietà/zona.

- Veneto est (Venezia/Treviso): sono appena visibili parti verdi (BBCH 51-53);
- Veneto ovest (Verona, Rovigo, Padova, Vicenza): Abate Fetel mazzetti affioranti. Le altre varietà sono a uno stadio fenologico più arretrato (gemma gonfia/apertura gemme).

Ticchiolatura/cancro rameali: trattamenti con sali di rame.

Maculatura: su Abate e Conference (con danni rilevati negli ultimi anni), programmare e provvedere alla rottura del cotico erboso interfilare.

Psilla: fase di ovideposizione. L'impiego di caolino aiuta molto come deterrente. In caso di dilavamento ripetere l'intervento. Veneto est: non si notano molti adulti svernanti.

Cecidomia (Contarinia pyrivora): dove ci sono stati problemi negli ultimi anni, specialmente su William o Kaiser, prevedere un trattamento insetticida con s.a. di contatto a mazzetti affioranti o sistemico a mazzetti divaricati. L'ovodeposizione inizia quando i sepali iniziano a separarsi e lasciano intravedere appena il "rosa dei petali", e termina con la cosiddetta "fase a palloncino".

Tentredine (Hopllocampa brevis): si consiglia di posizionare le trappole cromotropiche bianche per il monitoraggio.

ACTINIDIA

FASE FENOLOGICA:

- Veneto est (Venezia/Treviso): var. Hayward fine rigonfiamento gemme (BBCH 03);
- Veneto ovest (Verona, Rovigo, Padova, Vicenza): var. polpa gialla a gemma cotonosa/foglioline affioranti; var. polpa verde: rottura gemme.

PSA: qualche presenza di essudati, limitata su impianti vecchi. Trattare con sali di rame in pre e post potatura. Sulle ferite da dove fuoriesce l'essudato, la spennellatura con grassello di calce può contenere con buoni risultati la diffusione del batterio.

Cocciniglia: dove si riscontra una forte presenza di cocciniglia sui cordoni ed il fusto principale, intervenire con prodotti contenenti olio e zolfo già in miscela e pronti all'uso. Possibile intervenire anche con pyriproxifen ma solo in pre-fioritura.

NOCE

FASE FENOLOGICA: riposo vegetativo (BBCH 00). Le ore di raffreddamento e le porzioni di raffreddamento fino ad oggi registrate sono sufficienti per garantire una buona omogeneità di germogliamento e fioritura.

Batteriosi: al momento sono presenti solamente le lesioni causate dalla batteriosi della scorsa stagione, che risultano particolarmente numerose nei giovani noceti dove i trattamenti sono terminati anzitempo.

Carpocapsa: i gradi giorno accumulati nel 2025 sono in linea con i gradi giorno accumulati nel 2024. Ad oggi non si prevede alcun anticipo o ritardo del ciclo dell'insetto rispetto allo scorso anno.

In questo periodo non sono consigliati trattamenti fitosanitari.