

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 05 del 19/03/2025

Le previsioni meteo indicano ancora un periodo di temperature sotto la media che però terminerà con l'inizio della prossima settimana. Sono previste piogge per il week-end.

ALBICOCCO

FASE FENOLOGICA: stadio compreso tra piena fioritura e caduta petali.

Monilia: in previsione delle piogge di questo fine settimana proseguire con i trattamenti con le diverse sostanze attive indicate nelle LTDI (ricordarsi di alternare le s.a. in base al MoA – vedi <https://www.frac.info/>).

SUSINO

FASE FENOLOGICA le varietà europee in fase di prefioritura, le varietà cino-giapponesi sono piena fioritura, inizio caduta petali.

Monilia: per le varietà cino-giapponesi il rischio di infezione è elevato. Per il trattamento si rimanda a quanto indicato per il pesco.

Tentredine (Oplocampa flava): è il momento di installare le trappole cromotropiche bianche per monitorare il volo degli adulti. L'eventuale trattamento va eseguito a caduta petali.

PESCO

FASE FENOLOGICA: stadio variabile da piena fioritura ad inizio caduta petali a seconda delle varietà e zona di produzione.

Bolla, monilia, corineo: le piogge previste per il fine settimana sono favorevoli all'attività di questi patogeni. Per le varietà che hanno raggiunto la fase di caduta petali prevedere uno specifico trattamento cui aggiungere una sostanza attiva ad attività anti-monilia. Curare bene la bagnatura della vegetazione.

Tripidi (Taeniothrips meridionalis): dove il problema si presenta ogni anno e provoca una dannosità significativa, trattare all'inizio di caduta petali con una delle sostanze attive indicate nelle LTDI.

CILIEGIO

FASE FENOLOGICA: la fase fenologica è molto differenziata, e va da ingrossamento gemme ad inizio fioritura, in funzione delle varietà e della posizione altimetrica.

Corineo / Cocciniglia: sulle varietà ancora allo stadio di ingrossamento gemme (non oltre) trattare con olio, pyriproxifen e ziram.

Afidi: in prefioritura trattare con un aficida specifico.

Monilia: sulle varietà ad inizio fioritura e notoriamente sensibili alla monilia intervenire con un trattamento specifico prima della pioggia.

MELO

FASE FENOLOGICA: fase fenologica di mazzetti affioranti nel gruppo Pink e Granny Smith. In fase più attardata, ad orecchiette di topo le varietà del gruppo Gala, Golden, Regalyou, Story e Fuji. Il gruppo Imperatore si trova ancora a punte verdi. Nella zona orientale della regione la fase fenologica è in ritardo di circa una settimana.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

Ticchiolatura: i modelli indicano una potenziale infezione grave in concomitanza con le piogge previste per questo fine settimana. È necessario effettuare un trattamento con i normali prodotti di copertura, immediatamente prima della pioggia infettante, avendo cura di bagnare bene la vegetazione. Se la durata delle piogge supera i tre giorni rientrare con un trattamento ad azione tempestiva, usando i diversi prodotti di copertura.

PERO

FASE FENOLOGICA: fase fenologica differenziata in funzione delle diverse varietà. Abate Fetel quasi ovunque a mazzetti divaricati. William, Carmen, Fred e Conference fase di comparsa mazzetti fiorali. Più attardate le altre. La varietà Eden Gold ha raggiunto la fase di pre-fioritura.

Ticchiolatura: la ticchiolatura del pero, originando infezioni anche a partire dal micelio svernante, è in grado di originare infezioni anche solo a seguito di sole bagnature persistenti come quelle provocate da nebbie mattutine. Iniziare la copertura con fungicida, come indicato per il melo.

Cecidomia (Contarina pyrivora): l'ovodeposizione inizia quando i sepali iniziano a separarsi e lasciano intravedere appena il rosa dei petali e termina con la cosiddetta fase a palloncino. Dove ci sono stati problemi negli ultimi anni prevedere un trattamento insetticida con tau-fluvalinate a mazzetti affioranti.

Tentredine (Oplocampa brevis): installare in settimana le trappole cromotropiche bianche, specifiche per il monitoraggio del volo degli adulti.

ACTINIDIA

FASE FENOLOGICA: *A. chinensis* si trova nella fase fenologica compresa tra foglie affioranti/foglie imbricate. *A. deliciosa* è ad uno stadio più precoce, tra rottura gemme e gemma cotonosa.

PSA: in alcuni frutteti presenza di sintomi di batteriosi, con essudato in uscita dai tagli e ferite dal cordone principale e tralci produttivi.

Evitare in questi momenti qualsiasi taglio e rimandare la rimonda dei rami colpiti a dopo la fioritura. Eventualmente spennellare la ferita con grassello di calce per limitare la diffusione del batterio della PSA. In questa fase si possono utilizzare rameici autorizzati sulla coltura, prima della pioggia.