

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 07 del 03/04/2025

Le piogge dello scorso fine settimana hanno dato origine alla terza infezione grave di ticchiolatura della stagione. Per i prossimi giorni si prevede un andamento termico inizialmente nella media del periodo cui seguirà un deciso calo delle temperature. La probabilità di pioggia per i prossimi giorni rimane molto bassa.

ALBICOCCO

FASE FENOLOGICA:

Veneto ovest: stadio di allegagione.

Veneto est: fine fioritura (BBCH 69)

Batteriosi: le temperature in aumento e le bagnature consistenti sono condizioni favorevoli per le infezioni. Trattare con sali di rame (pianta asciutta). Utili anche i prodotti a base di microrganismi autorizzati per la coltura.

Nerume: nelle situazioni in cui si il rischio di infezione è elevato, a fine caduta petali trattare con pyraclostrobin.

Oidio: le condizioni ambientali e lo stadio fenologico della coltura sono favorevoli alle infezioni oidiche. Iniziare il controllo di questo patogeno utilizzando, nei trattamenti, zolfo (attivo anche contro il nerume) o le altre sostanze attive indicate nelle LTDI.

Corineo: la coltura è ancora nella fase sensibile. Nelle situazioni a rischio è opportuno intervenire con captano (no mix con zolfo).

Afidi: verificata la presenza intervenire con un trattamento aficida specifico.

Forficula: è il momento adatto per posizionare le trappole di cartone o, sui tronchi, le fasce collanti.

Si segnala in alcuni frutteti la presenza diffusa di monilia sui fiori e fusicocco sui rametti (*Fusicoccum amygdali*) a seguito delle abbondanti bagnature del periodo.

SUSINO

FASE FENOLOGICA:

Veneto ovest: le varietà europee in fase di piena fioritura, le varietà cino-giapponesi sono ad inizio allegagione.

Veneto est: inizio allegagione (BBCH 71).

Monilia: per le varietà europee il rischio di infezione è elevato. Per il trattamento si rimanda a quanto indicato per il pesco.

Afidi (afide farinoso): se presente intervenire con un trattamento specifico dopo caduta petali.

Tentredine (Oplocampa flava): è il momento di installare le trappole cromotropiche bianche per monitorare il volo degli adulti. L'eventuale trattamento va eseguito a caduta petali.

Cydia molesta: vedi pesco.

Tentredini delle susine (Hoplocampa flava, H. minuta): verificata la presenza con le trappole cromotropiche bianche (50 catture per trappola durante il periodo della fioritura) effettuare un trattamento a caduta petali con deltametrina.

Cydia funebrana: programmare l'installazione degli erogatori della confusione sessuale e le relative trappole per il monitoraggio.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

PESCO

FASE FENOLOGICA:

Veneto ovest: scamiciatura - inizio allegagione.

Veneto est: fine fioritura (BBCH 69).

Bolla, corineo: la fase fenologica e le condizioni meteo sono ancora favorevoli alle infezioni. Continuare la difesa con captano o triazoli (questi attivi anche contro oidio).

Afidi: a completa caduta petali ripetere il trattamento aficida con una delle sostanze attive indicate nelle LTDI. Anche in questo caso, curare bene la bagnatura della vegetazione, avendo cura di bagnare bene la vegetazione.

Cimice asiatica: con l'aumento delle temperature pomeridiane si intensifica lo spostamento degli adulti dai siti di svernamento verso le fonti di nutrimento, tra i quali anche i primi frutticini di pesco. Monitorare la presenza del fitofago ed eventualmente intervenire con un insetticida specifico.

Cydia molesta: distribuire le trappole per il monitoraggio.

CILIEGIO

FASE FENOLOGICA:

Veneto ovest: molto differenziata, e va da bottoni bianchi a piena fioritura, in funzione delle varietà e della posizione altimetrica.

Veneto est: comparsa dei petali – inizio fioritura (BBCH 57-60)

Monilia: sulle varietà ad inizio fioritura intervenire con un trattamento specifico.

MELO

FASE FENOLOGICA

Veneto ovest: nelle varietà del gruppo Pink e Granny Smith si nota l'apertura del fiore centrale. Golden e Gala sono nella fase di bottoni rosa. Gruppo Dallago è a mazzetti visibili.

Veneto est: Granny Smith/Gala stadio bottoni fiorali/mazzetti divaricati (BBCH 57-59).

Ticchiolatura (Venturia inaequalis): in questi giorni, sui testimoni non trattati, si notano le prime macchie fogliari, come conseguenza dell'infezione di metà marzo. Nei prossimi giorni non sono previste piogge, tuttavia bisogna continuare a mantenere, in previsione delle piogge, la protezione con coperture adeguate. I prodotti a disposizione da utilizzare sono diversi, da soli od in miscela, sempre in chiave preventiva. Momento adatto anche per i triazoli e le SDHI.

Oidio (Podosphaera leucotricha): i modelli indicano l'inizio delle infezioni secondarie. In questa fase iniziare la difesa antioidica aggiungendo un antioidico specifico agli altri trattamenti programmati.

Afide grigio (Dysaphis plantaginea): si notano le prime fondatrici. A bottoni rosa/prefioritura effettuare il trattamento specifico, utilizzando una delle diverse sostanze attive a disposizione, curando bene la bagnatura fogliare.

Eulia (Argyrotaenia pulchellana): prime catture. Come già riportato precedentemente, è un fitofago in aumento, da tenere sotto controllo con un monitoraggio attento.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

PERO

FASE FENOLOGICA:

Veneto ovest: la cultivar Abate Fetel è in piena fioritura. Fioritura per le William bianche e rosse e Carmen. Inizio fioritura per Conference, Fred. Mazzetti divaricati per Santa Maria e Kaiser.

Veneto est: Kayser mazzetti affioranti (BBCH 59), Abate inizio fioritura (BBCH 61).

Ticchiolatura (*Venturia pyrina*): il pero si trova nella fase fenologica molto critica. Per questo è necessario prestare la massima attenzione poiché *V. pyrina* dà origine ad infezioni anche solo in presenza di forti bagnature. Mantenere costante la copertura della vegetazione usando i prodotti a disposizione indicati nelle LTDI.

Erwinia amylovora: porre attenzione alle grandinate, episodi che danno inizio alle infezioni. In caso intervenire con prodotti a base di rame, microrganismi, laminarina oppure acibenzolar-S-methyl (utilizzo consentito fino al 10/07/2025).

Tentredine (*Oplocampa brevis*): dopo la caduta petali nei frutteti colpiti da tentredine negli ultimi anni o con catture sulle trappole cromotropiche trattare con acetamiprid o flupyradifurone (attivi anche contro gli afidi).

ACTINIDIA

FASE FENOLOGICA: *A. chinensis* si trova nella fase di infiorescenze affioranti. *A. deliciosa* è nella fase di foglie embricate.

PSA: si nota l'emissione di notevole essudato batterico, favorita dall'elevata idratazione delle piante.

Le condizioni sono favorevoli alle infezioni, sia per il meteo che per la fase fenologica. Trattamenti preventivi, prima della pioggia, con rame continuano ad essere sempre efficaci. Efficace, in alternativa, l'utilizzo di acibenzolar-S-methyl, per il quale la possibilità di utilizzo scade il 10/07/2025. Utile anche l'utilizzo di laminarina.

Non effettuare la potatura dei rami infetti, che andranno asportati dopo la fioritura.