

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 10 del 24/04/2025

Per i prossimi giorni le temperature si aggireranno attorno alla media del periodo. Non sono previste precipitazioni significative.

PESCO

FASE FENOLOGICA: Allegagione Inizio ingrossamento frutti (BBCH 71-73)

Bolla (*Taphrina deformans*): si notano sintomi di bolla su alcune varietà. Permane il periodo di sensibilità alle infezioni della coltura, la difesa è ancora consigliata. Continuare i trattamenti con captano, dodina o triazoli (questi attivi anche contro oidio).

Nerume (*C. carpophilum*): favorito dal clima di questi giorni. La fase di maggior rischio va da inizio scamiciatura e si protrae per circa 30 giorni. Nelle situazioni a rischio intervenire con zolfo o pyraclostrobin.

Afidi: effettuare, se non già eseguito, il trattamento a completa caduta petali, curando bene le bagnature ed impiegando prodotti a base di flonicamid, pirimicarb, sulfoxaflor, acetamiprid (attivo anche verso i miridi).

Cydia molesta: iniziata la fase larvale. Se in presenza di sintomi intervenire con prodotti ad azione larvicida (emamectina benzoato, etc.)

Anarsia lineatella: distribuire le trappole per il monitoraggio.

ALBICOCCO

FASE FENOLOGICA: stadio di ingrossamento frutto (BBCH 75-77).

Batteriosi: ancora opportuno, per le varietà tardive, trattare con sali di rame (pianta asciutta). Utili anche *Bacillus subtilis*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *Bacillus amyloliquefaciens* D747.

Nerume: considerate le condizioni meteo favorevoli, nelle situazioni in cui si il rischio di infezione è elevato, a fine caduta petali trattare con pyraclostrobin.

Oidio: le condizioni ambientali e lo stadio fenologico della coltura sono favorevoli alle infezioni oidiche. Continuare il controllo di questo patogeno utilizzando, nei trattamenti, zolfo (attivo anche contro il nerume) o le altre sostanze attive indicate nelle LTDI.

Forficula: monitorare la vegetazione per accertare l'eventuale presenza di forficula. Disporre le colle specifiche applicate alla base del fusto, efficaci nelle catture. In caso di accertata presenza, trattamento notturno con lambda-cialotrina aiuta a ridurre la popolazione.



Stadio fenologico albicocco (SFR Veneto – 23/04/2025)

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

SUSINO

FASE FENOLOGICA:

Varietà europee: allegagione (BBCH 71)

Varietà cino-giapponesi: accrescimento dei frutti (BBCH 73)

Nerume (*Cladosporium sp.*): considerato l'aumento della diffusione della malattia programmare un'adeguata strategia di difesa; intervenire prima delle eventuali piogge previste con una delle sostanze attive presenti nelle LTDI.

Afidi (afide farinoso): se presente intervenire con un trattamento specifico dopo caduta petali.

Tentredini delle susine (*Hoplocampa flava*, *H. minuta*): verificata la presenza con le trappole (50 catture per trappola durante il periodo della fioritura) effettuare un trattamento a caduta petali con deltametrina. Gli eventuali trattamenti aficidi con acetamiprid e flupiradifurone sono efficaci anche contro questo fitofago.

Cydia funebrana: continuare il monitoraggio. Iniziata l'ovideposizione. Prossimo l'intervento con un ovo-larvicida come clorantraniliprole.

Cydia molesta: vedi indicazioni pesco.



Stadio fenologico susino (SFR Veneto - 23/04/2025)

CILIEGIO

FASE FENOLOGICA

Allegagione – accrescimento frutto in funzione della varietà e della posizione (BBCH 71-75)

Afidi (*Myzus cerasi*): continuare le osservazioni ne frutteto. Alla comparsa dei primi focolai intervenire con aficida specifico (acetamiprid se presenza anche di cimice).



Stadio fenologico ciliegio (SFR Veneto - 23/04/2025)

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

MELO

FASE FENOLOGICA

Veneto ovest: frutticini in accrescimento

Veneto est: allegagione (BBCH 71)

Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*): sono evase le infezioni di marzo e nei prossimi giorni sarà il turno di quelle di metà aprile. Mantenere un'adeguata protezione con le sostanze attive a disposizione da utilizzare sempre in chiave preventiva.

Oidio (*Podosphaera leucotricha*): incremento deciso del rischio di infezioni secondarie. Mantenere la difesa antioidica aggiungendo, agli altri trattamenti programmati, un prodotto specifico.

Afide grigio (*Dysaphis plantaginea*): se non eseguito, effettuare il trattamento post-fiorale, avendo cura di garantire una perfetta bagnatura della vegetazione.

Carpocapsa (*Cydia pomonella*): iniziato il volo in tutte le località. In generale si nota un ritardo di circa sei – sette giorni rispetto alla scorsa stagione.

Eulia (*Argyrotaenia sp.*): iniziata l'ovideposizione. Come già riportato precedentemente, è un fitofago in aumento, da tenere sotto controllo con un monitoraggio attento. Nei siti ritenuti a rischio è il momento di effettuare il trattamento insetticida (ovo-larvicida).



Afide grigio su foglia di melo (SFR Veneto - 23/04/2025)

PERO

FASE FENOLOGICA

Veneto ovest: fase fenologica tra differenziazione ed accrescimento dei frutticini.

Veneto est: Kayser/Abate – allegagione (BBCH 71).

Ticchiolatura (*Venturia pyrina*): il pero si trova ancora nella fase fenologica critica. Prestare la massima attenzione e mantenere costante la copertura della vegetazione usando i prodotti a disposizione indicati nelle LTDI, in particolare prima delle piogge.

Maculatura (*Stemphylium vesicarium*): nelle varietà sensibili alla maculatura (Abate), è il momento di attivare la consueta difesa fungicida.

Tentredine (*Hoplocampa brevis*): ancora possibile, nei frutteti colpiti da tentredine negli ultimi anni o con catture sulle trappole cromotropiche, trattare con acetamiprid o flupyradifurone (attivi anche contro gli afidi).

Psilla (*Cacopsylla pyri*): adulti di psilla di prima generazione in piena attività di ovideposizione. In questa fase interventi con caolino, da ripetere sino a metà maggio sono un buon deterrente per l'ovideposizione. Anche il rilascio di antocoridi da inizio a fine maggio rappresenta una tecnica di difesa efficace ed ormai consolidata.

Carpocapsa: vedi melo.

Cimice asiatica: posizionare i totem per la cattura massale. Monitorare il frutteto per individuare eventuali presenze del fitofago.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ACTINIDIA

FASE FENOLOGICA:

A. chinensis e deliciosa: accrescimento della vegetazione, più marcato in *A. chinensis*. Rigonfiamento e crescita delle gemme fiorali (BBCH tra 51 e 53)

PSA (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*): situazione immutata rispetto alla settimana scorsa. Trattamenti preventivi, prima della pioggia, con rame continuano ad essere sempre efficaci. Efficace acibenzolar-s metil (revocato: utilizzo entro il 10/07/2025) e l'uso della laminarina.

Si segnala in alcuni impianti la presenza di *Pseudomonas viridiflava* e PSA (in particolare su Hayward); Al contrario, al momento, non si segnalano particolari problemi con cimice asiatica, eulia e cocciniglia. Le frequenti piogge delle ultime settimane e lo stadio fenologico sono favorevoli alla moria del kiwi.

NOCE

FASE FENOLOGICA:

Var. Lara: sviluppo germogli BBCH 12-13; fiori femminili BBCH 600 (inizio fioritura).

Var. Chandler: stadio leggermente più avanzato.

In generale, nelle zone interne del Veneto lo stadio di fioritura è più avanzato rispetto a quello che si riscontra verso la costa.

Carpocapsa (*Cydia pomonella*): raggiunta la sommatoria termica di 177° giorno. Prima cattura effettuata al raggiungimento di 162° giorno (21 aprile);

Batteriosi (*Xanthomonas juglandis*): la presenza di piogge della scorsa settimana e le bagnature fogliari di questi giorni, accompagnate da temperature diurne piuttosto elevate stanno facendo aumentare notevolmente il rischio di infezioni da *Xanthomonas juglandis*.

Al momento su var. Lara non sono visibili attacchi di batteriosi su foglia.

NAB: con l'inizio della fioritura inizia la suscettibilità della noce alla Necrosi Apicale Bruna (NAB) causata da funghi del genere *Alternaria*, *Fusarium* e *Colletotrichum*.

Interventi fitosanitari: per le aziende che hanno terminato o stanno terminando il secondo intervento contro la Batteriosi, ove previste piogge moderate nei prossimi giorni, si consiglia di trattare nei primi giorni della prossima settimana con: Rame + Solfato di Zn + Captano con l'aggiunta di Tebuconazolo in quanto in fase di fioritura la noce diventa sensibile agli agenti della Necrosi Apicale Bruna.