

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

OLIVO

Bollettino n. 02 del 12/03/2025

FENOLOGIA

Ripresa vegetativa.

STATO DEGLI OLIVETI

Le operazioni di potatura sono in corso, a livello regionale, hanno attualmente interessato circa il 30% degli oliveti.

CONCIMAZIONE DELL'OLIVETO

Le precipitazioni recenti hanno apportato un'idratazione moderata a terreni e piante, creando le condizioni ideali per la distribuzione dei fertilizzanti, prevista per metà marzo. L'azoto (N) è l'elemento principale, poiché stimola lo sviluppo di nuova vegetazione, rametti fruttiferi e favorisce sia la fecondazione dei fiori che l'allegagione.

Oltre all'azoto, è consigliato integrare con fosforo (P), potassio (K) e aggiungere sostanza organica, che migliora la fertilità del suolo, la porosità e la capacità di trattenuta idrica.

I fertilizzanti consigliati includono concimi organominerali NPK, ad esempio con caratteristiche 12-5-5 circa 10 quintali ettaro da distribuiti in modo frazionato:

- 2/3 all'inizio della ripresa vegetativa (metà marzo).
- 1/3 prima della fioritura.

La distribuzione dei concimi va effettuata sotto la proiezione della chioma della pianta, dove l'apparato radicale è maggiormente attivo. Questo approccio garantisce un rilascio graduale di nutrienti, un'efficienza di assorbimento superiore e un equilibrio vegeto-produttivo ottimale. Dopo lo spargimento va attuata una leggera lavorazione del terreno di ricopertura del fertilizzante.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Si raccomanda in post potatura d'eseguire un intervento di disinfezione della chioma e del tronco con prodotti rameici o dodina, utile a contrastare i parassiti fungini, in particolare l'Occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*) e la Piombatura dell'olivo (*Pseudocercospora cladosporioides*). Interventi che servono a contenere anche la Rogna dell'olivo (*Pseudomonas savastanoi*), un batterio che penetra nei tessuti tramite ferite, causando escrescenze sui rami e danneggiando la pianta.