

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

OLIVO

Bollettino n. 06 del 30/04/2025

FENOLOGIA

Presenza di infiorescenze ben sviluppate e ingrossate, che indicano l'avanzamento verso le fasi di mignolatura e fioritura.

FERTILIZZAZIONI

Probabilmente, tra quindici o venti giorni inizierà la fioritura, momento in cui le esigenze nutrizionali dell'olivo diventano intense. La pianta richiede un maggiore apporto di nutrienti; è quindi importante valutare l'opportunità di una fertilizzazione azotata. Si consiglia di utilizzare urea a basso contenuto di biureto, in una concentrazione massima dell'1-1,5%, ossia disciogliendo 1-1,5 kg di urea per ogni ettolitro d'acqua. È possibile aggiungere del boro per favorire l'allegagione, prestando però particolare attenzione alle indicazioni riportate sull'etichetta riguardo alla concentrazione massima consentita del prodotto.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Cecidomia delle foglie dell'olivo (*Dasineura oleae*): le osservazioni condotte non hanno ancora rivelato lo sfarfallamento degli adulti. La popolazione è limitata e non è necessario attuare alcun intervento fitosanitario.

Cotonello dell'olivo (*Euphyllura olivina*): si registra una limitata presenza su germogli e infiorescenze.

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*): il monitoraggio settimanale ha rilevato un aumento della popolazione, al momento non sono necessari interventi a contrasto.

Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*): circa il 7% delle uova risulta schiuso, al momento non vi è la necessità di un intervento fitosanitario.

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): i controlli settimanali hanno evidenziato un aumento delle catture di adulti maschi, indicando un'attività molto dinamica della popolazione. Per chi desidera posizionare trappole a lunga durata (180 giorni), questo è il momento opportuno per farlo.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*): questa settimana si è registrato un aumento degli adulti della generazione svernante.

Parassiti fungini: si segnala la presenza di infezioni da Occhio di pavone. In caso di accertata presenza, si consiglia di intervenire con Dodina, Fosfonato di potassio o triazoli, sostanze attive che esercitano sia un effetto curativo sia preventivo, contrastando efficacemente la diffusione delle infezioni.