

## BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

### OLIVO

*Bollettino n. 04 del 11/03/2026*

#### FENOLOGIA

Ripresa vegetativa avanzata.

La ripresa vegetativa è in corso in tutte le aree olivicole venete. Nelle esposizioni più favorevoli si osservano il rigonfiamento avanzato delle gemme e le prime distensioni fogliari.

L'attività radicale è in aumento, con temperature del suolo prossime ai 10-11°C.

#### OPERAZIONI COLTURALI E CONCIMAZIONE

Le operazioni di potatura sono in fase avanzata e hanno interessato circa il 30% degli oliveti regionali.

Le recenti condizioni di umidità del suolo rendono ottimale la finestra di metà marzo per il primo apporto di nutrienti azotati.

#### SITUAZIONE FITOSANITARIA

**Occhio di pavone** (*Spilocaea oleaginea*): le condizioni di umidità mattutina possono favorire nuove infezioni. Si raccomanda un trattamento preventivo con rameici, oppure dodina in caso di presenza accertata del patogeno.

**Piombatura dell'olivo** (*Pseudocercospora cladosporioides*): il trattamento rameico post-potatura contribuisce a contenere anche questa patologia fogliare, particolarmente insidiosa nei periodi umidi.

**Rogna dell'olivo** (*Pseudomonas savastanoi*): le ferite da potatura rappresentano il principale punto di ingresso del batterio. Gli interventi consigliati sono: disinfezione con prodotti rameici dopo i tagli, eventuali integrazioni con prodotti a base di rame + zinco, impiego di distillato di legno come coadiuvante.

**Tripide dell'olivo** (*Liothrips oleae*): in alcuni oliveti si osservano sintomi residui della stagione precedente (foglie deformate, ispessite). Con il rialzo termico, gli adulti tenderanno a spostarsi sui nuovi germogli. In questa fase non è richiesto alcun intervento specifico. Eventualmente, nelle disinfezioni post-potatura con ossicloruro o idrossido di rame, è possibile aggiungere Sapone Molle di Potassio, utile per contrastare l'azione dei tripidi e migliorare bagnatura e adesività del trattamento.