SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO

U.O. Fitosanitario

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

OLIVO

Bollettino n. 09 del 15/04/2026

FENOLOGIA

La ripresa vegetativa negli oliveti veneti procede regolarmente e in linea con l'avanzamento stagionale. Gli olivi si trovano nella fase di pieno accrescimento dei germogli apicali e laterali, con le mignole (gemme a fiore) visibili e in fase di allungamento. Lo stato generale degli impianti è buono, con chiome dal verde intenso che segnalano un normale equilibrio nutrizionale e un vigore adeguato in vista dell'imminente fioritura.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Mosca dell'olivo *(Bactrocera oleae):* le attuali temperature favoriscono i voli degli adulti. È già possibile procedere all'installazione di trappole "attract and kill" a lunga durata (fino a 180 giorni) per garantire un controllo preventivo delle popolazioni.

Tignola dell'olivo *(Prays oleae):* prosegue il monitoraggio della generazione fillofaga e antofaga tramite trappole attrattive. Con l'allungamento dei racemi, le larve inizieranno a spostarsi verso le infiorescenze; al momento non sono tuttavia previsti interventi di contrasto.

Margaronia *(Palpita unionalis):* si osserva la presenza delle prime larve sulle vegetazioni apicali, favorite dalle temperature miti. Sono visibili erosioni fogliari e foglie accoppiate da fili sericei; il monitoraggio va proseguito con attenzione, specialmente negli impianti giovani, sebbene non sia attualmente necessario alcun intervento.

Cecidomia *(Dasineura oleae):* la popolazione è composta prevalentemente da larve di seconda e rare di terza età, senza evidenza di fori di sfarfallamento; non sono necessari trattamenti.

Cimice asiatica *(Halyomorpha halys):* la presenza è al momento limitata e le densità attuali degli individui non richiedono interventi fitosanitari.

Fleotribo e altri fitofagi: le condizioni attuali ne favoriscono la mobilità e le eventuali ovideposizioni.

Prevenzione malattie fungine e batteriche: La protezione delle ferite di potatura rimane una fase cruciale per prevenire l'ingresso di patogeni come l'Occhio di pavone e il batterio della Rogna.

È consigliabile un trattamento disinfettante post-potatura utilizzando prodotti rameici o Dodina.