SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO

U.O. Fitosanitario

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

OLIVO

Bollettino n. 11 del 29/04/2026

FENOLOGIA

Fase di accrescimento dei germogli apicali e laterali, con infiorescenze ormai sviluppate e in distensione. Le chiome mantengono un verde intenso, segnale di buon equilibrio nutrizionale e di un apparato radicale attivo grazie a temperature del suolo stabilmente superiori ai 13°C.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Mosca dell'olivo *(Bactrocera oleae):* le temperature attuali favoriscono l'attività degli adulti. I monitoraggi indicano un aumento delle catture di maschi, segnale di una dinamica di popolazione attiva. È possibile procedere all'installazione di trappole "Attract & Kill" a lunga durata (fino a 180 giorni), soprattutto negli oliveti con residui di drupe non raccolte.

Tignola dell'olivo *(Prays oleae):* la popolazione è in incremento. La generazione fillofaga–antofaga precoce è in fase di transizione verso le infiorescenze.

Margaronia *(Palpita unionalis/Palpita vitrealis):* larve su germogli e foglie giovani, con erosioni fogliari e foglie accoppiate da fili sericei. L'impiego di *Bacillus thuringiensis* è consigliato solo in caso di estese infestazioni.

Cecidomia delle foglie *(Dasineura oleae):* inizio limitato dei voli, con fori di sfarfallamento. Non è necessario alcun intervento.

Cimice asiatica *(Halyomorpha halys):* presenza di adulti svernanti nelle aree periferiche degli oliveti, con un leggero incremento rispetto alla settimana precedente. Le densità attuali non richiedono interventi.

Cotonello dell'olivo *(Euphyllura olivina):* presenza ancora contenuta e localizzata su germogli e infiorescenze, regolata dai predatori naturali.

Cocciniglia mezzo grano di pepe *(Saissetia oleae):* le schiuse risultano limitate a circa 10% e non richiedono interventi.

Prevenzione delle malattie fungine e batteriche: Le condizioni climatiche della terza decade di aprile mantengono un medio rischio infettivo per Occhio di pavone *(Venturia oleaginea),* Piombatura *(Colletotrichum spp.)* e Rogna dell'olivo *(Pseudomonas savastanoi).* Nelle aree in pre-fioritura, se necessario, è possibile intervenire con Dodina (azione preventiva e curativa), Fosfonato di potassio (azione sistemica) e fungicidi Inibitori della Demetilazione (DMI) e Strobilurine come riportato nel Disciplinare Produzione Integrata (https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata).