SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO

U.O. Fitosanitario

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

OLIVO

Bollettino n. 16 del 03/06/2026

FENOLOGIA

Tra fine fioritura, allegagione e primo accrescimento delle olive.

SITUAZIONE FISIOLOGICA DELLE PIANTE

Gli olivi presentano un buon stato vegetativo. L'allegagione rimane non uniforme tra areali, con differenze legate soprattutto alla variabilità termica di fine maggio, con qualche lieve ritardo nelle zone più fredde o soggette a temporali intensi.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Tignola dell'olivo *(Prays oleae):* il monitoraggio settimanale mostra un aumento delle catture di adulti e delle ovideposizioni. Il calo termico ha leggermente rallentato lo sviluppo larvale. Data la difformità fenologica degli areali, è necessario un controllo attento per valutare l'opportunità di intervento. Al momento non è necessario alcun intervento, tuttavia negli areali storicamente più colpiti è possibile intervenire con *Bacillus thuringiensis*, in funzione dello stadio prevalente.

Margaronia *(Palpita unionalis):* presenza confermata in diversi oliveti, gli interventi mirati alla Tignola dell'olivo risulteranno efficaci anche nel contenere questo lepidottero. Nelle zone colpite dai temporali, l'umidità elevata può favorire un incremento delle ovideposizioni, mantenere il controllo attivo.

Cimice asiatica *(Halyomorpha halys):* la presenza rimane bassa, le osservazioni visive indicano una lieve attività di adulti, soprattutto lungo i margini e nelle aree di confine con altre colture sensibili. Sono stati notati anche i primi stadi giovanili. Le piogge e il calo termico non hanno modificato in modo significativo la presenza dell'insetto, non si giustificano interventi specifici; è opportuno, comunque, mantenere un controllo visivo costante, soprattutto nelle zone di confine con frutteti o colture attrattive, dove gli adulti possono sostare temporaneamente prima di migrare verso ospiti più idonei.

Cocciniglia mezzo grano di pepe *(Saissetia oleae):* le migrazioni delle neanidi sono iniziate ma non hanno ancora raggiunto le soglie d'intervento. L'umidità post-temporale può favorire la sopravvivenza delle neanidi sulle pagine inferiori delle foglie. Si consiglia di attendere i prossimi bollettini per definire il momento ottimale di intervento.

Fumaggine: negli oliveti con presenza di cocciniglia, gli imbrattamenti da fumaggine risultano al momento limitati. Gli interventi fungicidi eseguiti per il controllo dell'Occhio di pavone contribuiscono a contenere anche questa alterazione.

Mosca dell'olivo *(Bactrocera oleae):* le temperature più favorevoli della settimana scorsa hanno favorito i voli. Per chi intende adottare la cattura massale, questa è la settimana ideale per iniziare il posizionamento delle trappole.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

Parassiti fungini: Occhio di pavone *(Spilocaea oleagina),* Lebbra *(Gloeosporium olivarum),* Piombatura *(Mycocentrospora cladosporioides):* le piogge e l'umidità elevata hanno creato condizioni favorevoli allo sviluppo dei principali patogeni fogliari e dei frutti. In caso di necessità, si consiglia un intervento con: Sali rameici (solo a fioritura completamente conclusa); Fosfonato di potassio; Dodina; Pyraclostrobin.