

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

OLIVO

Bollettino n. 18 del 17/06/2026

FENOLOGIA

Gli oliveti si trovano in allegagione avanzata, primo accrescimento, con drupe che hanno raggiunto dimensioni medie di 7–14 mm. Le temperature elevate della terza decade di giugno stanno accelerando la crescita, mentre le piogge sparse delle settimane precedenti hanno mantenuto un discreto equilibrio idrico nei suoli più profondi.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*): le drupe sono ancora in fase sensibile e la finestra d'intervento è ancora aperta, se non già eseguito, è possibile intervenire nei prossimi giorni con *Spinetoram*, oppure *Bacillus thuringiensis* (da distribuire nelle ore serali, essendo fotolabile). Bagnare uniformemente la chioma e ripetere il trattamento secondo etichetta se necessario.

Margaronia (*Palpita unionalis*): presenza generalmente contenuta. Gli interventi eseguiti contro tignola contribuiscono a limitarne la popolazione. Intervenire solo in caso di infestazioni estese.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*): presenza in aumento, anche se la pressione è ancora moderata. Entro la prossima settimana è possibile programmare un intervento con Deltametrina, efficace anche nel contenere, con effetto collaterale, anche tignola, margaronia, cocciniglie e mosca delle olive.

Cotonello dell'olivo (*Euphyllura olivina*): permangono piccole colonie su germogli apicali. Gli interventi contro tignola o cimice ne riducono ulteriormente la presenza. Nessun intervento specifico consigliato, salvo forti infestazioni.

Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*): le migrazioni di neanidi stanno raggiungendo le soglie d'intervento in diversi oliveti, in caso di necessità utilizzare Olio minerale, oppure Sali potassici di acidi grassi. Monitorare attentamente le piante più vigorose e le chiome interne.

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): si registra una ripresa del volo degli adulti. Per chi adotta la cattura massale o sistemi "Attract & Kill", questo è il momento corretto per posizionare le trappole sulle chiome.

Fumaggine: negli oliveti colpiti da cocciniglia o cotonello si osservano imbrattamenti nerastri. I trattamenti insetticidi e fungicidi già programmati contribuiscono a ridurre l'impatto.

Avversità fungine: rimangono presenti soprattutto nelle aree collinari e nei siti più umidi. In caso di necessità intervenire con Sali rameici, Fosfonato di potassio, Pyraclostrobin. Nelle aree ventilate e asciutte il rischio è in calo.

Eventi grandinigeni: siamo entrati nel periodo dell'anno in cui sono possibili grandinate improvvise, con danni meccanici ai tessuti vegetali e rischio di infezioni fungine e batteriche. In caso di grandinata intervenire entro 24 ore con sali rameici, per favorire la disinfezione e la cicatrizzazione delle lesioni.