

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

OLIVO

Bollettino n. 23 del 12/07/2026

FENOLOGIA

Secondo ingrossamento della polpa.

DIFESA FITOSANITARIA

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): le catture rimangono contenute, ma i campionamenti sulle olive mostrano punture sterili, qualche ovideposizione e alcune forme larvali con mortalità da caldo. Le condizioni meteorologiche più miti e umide rispetto alle settimane precedenti stanno favorendo una graduale riattivazione dell'attività riproduttiva, è quindi necessario mantenere alta l'attenzione e seguire con regolarità i monitoraggi aziendali.

In questa fase la difesa deve restare preventiva, puntando sulle strategie repellenti e antideponenti. Le aziende che impiegano polveri minerali, caolino calcinato, basalto, bentonite, talco, zeolite, devono garantire una copertura uniforme della chioma e ripristinarla in caso di dilavamento, poiché in questo periodo tali prodotti svolgono anche un utile effetto antideponente, soprattutto quando le temperature massime scendono sotto i 32-33 °C. L'impiego di adesivanti può prolungare la persistenza del film protettivo.

Nelle aree più fresche o irrigue, dove la mosca tende a riattivarsi più rapidamente, trovano spazio i sistemi "Attract and Kill", le trappole per la cattura massale e le esche proteiche, dai formulati a base di Spinosad alle esche attivate con Acetamiprid, Deltametrina o Cyantraniliprole, che agiscono sugli adulti nel momento in cui riprendono a nutrirsi, senza richiedere coperture totali.

Qualora i monitoraggi aziendali rilevassero ovideposizioni attive, rimane la possibilità di ricorrere agli ovo-larvicidi previsti dal disciplinare di difesa integrata. In assenza di infestazione attiva, la difesa deve restare preventiva.

Si raccomanda infine di verificare il corretto funzionamento delle trappole per la cattura massale e di consultare i prossimi bollettini fitosanitari per eventuali aggiornamenti.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*): le popolazioni continuano a mantenersi su livelli bassi; anche la presenza giovanile rimane contenuta, senza segnali di incremento né di espansione della pressione del fitofago. Nell'eventualità di particolare pressione del parassita è possibile ricorrere ad interventi con deltametrina, che ha azione di contenimento anche sulla popolazione di mosca delle olive.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

Parassiti fungini: Al momento non sono necessari interventi fitosanitari. Vanno controllati eventuali sintomi, soprattutto negli oliveti che hanno presentato defogliazioni da Occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*).

Gli eventuali trattamenti rameici hanno anche un effetto collaterale antideponente contro la mosca dell'olivo.

Danni da grandine e vento:

Nella settimana scorsa si sono segnalate locali grandinate negli areali olivicoli del Veneto; gli episodi registrati sono stati di media o modesta intensità. Anche i colpi di vento associati ai temporali hanno localmente prodotto danni apprezzabili con incrementi della cascola. Qualora si verificassero eventi grandinigeni o raffiche più intense nelle prossime giornate, è necessario intervenire prontamente con prodotti rameici per disinfettare le ferite e ridurre l'insorgenza o la diffusione di Rogna dell'olivo (*Pseudomonas savastanoi*).