

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

OLIVO

Bollettino n. 24 del 29/07/2026

FENOLOGIA E STATO PRODUTTIVO

Secondo ingrossamento delle olive.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): le recenti condizioni climatiche hanno favorito una ripresa dell'attività di ovideposizione. Nelle trappole da monitoraggio si registra un limitato aumento delle catture, con presenza di femmine. I campionamenti effettuati sulle olive mostrano ovideposizioni attive e larve di primo stadio, anche se con una distribuzione disomogenea tra le diverse aree. Di massima, da osservazioni dirette e analisi previsionali di stima, abbiamo le seguenti percentuali d'infestazioni:

- Alto, medio e basso lago di Garda, 2%;
- Entroterra gardesano, 2 – 3%;
- Colline veronesi Nord-Est, 1 – 2%;
- Colline veronesi centrali, infestazioni 2%;
- Colli Berici Zona Nord-Est, 1%;
- Colli Berici Zona Sud-Ovest, 2%;
- Colli Euganei Zona Nord-Est, 1%;
- Colli Euganei Zona Sud-Ovest, 2 – 3%;
- Lessinia Vicentina, 2%;
- Pedemontana Vicentina, 1 – 2%;
- Pedemontana trevigiana areale del Grappa - Asolo, 2%;
- Litorale veneziano, 3%

Le previsioni meteorologiche indicano una settimana caratterizzata da aumenti delle temperature, che potrebbero limitare le ovideposizioni, pur tuttavia la situazione può variare nei diversi areali, si consiglia, pertanto, di rimanere in allerta e mantenersi aggiornati con i prossimi bollettini. In caso di necessità, al superamento della soglia del 4-5%, si consiglia d'intervenire con prodotti ovicidi e larvicidi, Acetamiprid o Flupiradifurone, Silicato di alluminio (caolino calcinato), Azadiractina. Le aziende che seguono pratiche di agricoltura biologica possono invece impiegare esche adulticide, come lo Spinosad o esche attivate con insetticidi, esempio Acetamiprid o Cyantraniliprole.

Si ricorda che eventuali azioni coprenti la vegetazione con polveri di roccia (bentoniti, caolini, zeoliti) limitano le ovideposizioni, oltre ad avere un effetto termoregolatore sulla vegetazione.

Margaronia (*Palpita unionalis*): la pressione è contenuta; gli interventi contro la mosca contribuiscono indirettamente a limitarne la popolazione.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*): presenze limitate di adulti di prima generazione. Anche in questo caso, la difesa contro la mosca riduce la popolazione.

Fumaggine: in caso di presenza, è consigliato l'impiego di sali potassici degli acidi grassi.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

Occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*) e **Piombatura** (*Pseudocercospora cladosporioides*): le condizioni di notti umide e di locali precipitazioni, che favoriscono prolungate bagnature fogliari, hanno favorito un incremento dei sintomi. Se necessario, intervenire con prodotti rameici, che offrono anche un effetto antideponente utile contro la mosca.