

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

OLIVO

Bollettino n. 30 del 09/09/2026

FENOLOGIA E STATO PRODUTTIVO

Invaiaitura in corso, con viraggio poco evidente, la colorazione procede lentamente per effetto delle alte temperature delle settimane precedenti.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): i dati rilevati dai controlli su trappole da monitoraggio mostrano una limitata presenza di catture di adulti. Le infestazioni rimangono pressoché costanti rispetto alla settimana scorsa, si riportano le osservazioni sulle olive e le analisi previsionali:

- Alto lago di Garda: 3 – 4%
- Medio e basso lago di Garda: 3 – 4%
- Entroterra gardesano: 3 – 4%
- Colline veronesi Nord: 3 – 4%
- Colline veronesi Centrali: 3 – 4%
- Colline veronesi Sud: 3 – 4%
- Colli Berici: 3 – 4%
- Colli Euganei: 3 – 4%
- Pedemontana vicentina: 3 – 4%
- Grappa–Asolo: 3 – 4%
- Litorale veneziano: 4 – 6%

Strategie di difesa, interventi ovo-larvicidi: Acetamiprid (max 2 trattamenti/anno); Flupyradifurone (max 1 trattamento/anno). *Difesa adulticida con esche avvelenate:* Spinosad (max 8 applicazioni/anno – ammesso in biologico); Cyantraniliprole (max 3 applicazioni/anno) Verificare la copertura delle esche, soprattutto dopo piogge >10 mm. *Difesa adulticida diretta:* Azadiractina; Piretro naturale (foto e termolabile – applicare al tramonto, bagnando bene le chiome); Beauveria bassiana (fungo entomopatogeno attivo contro adulti, va applicato al mattino presto o al tramonto, quando l'umidità è più elevata e gli insetti sono meno attivi. È ammesso in agricoltura biologica).

Protezione antideponente: rinforzare la copertura con farine fossili abbinate a adesivanti, soprattutto dopo eventi piovosi.

Patogeni fungini: Occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*); Piombatura (*Mycocentrospora cladosporioides*); Lebbra (*Colletotrichum spp.*): in caso di sintomi o condizioni favorevoli (umidità elevata, piogge recenti, bagnatura fogliare prolungata), intervenire con prodotti rameici abbinati a zolfo.

Attenzioni particolari: con l'avvicinarsi della raccolta, verificare con attenzione i tempi di carenza riportati sulle etichette dei prodotti fitosanitari.