

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 01 del 25/02/2026

PESCO

Le piogge della settimana scorsa hanno idratato l'inoculo svernante dei patogeni che, al verificarsi delle condizioni favorevoli, sono già in grado di dare origine alle prime infezioni.

Bolla (*Taphrina deformans*): in generale si osserva la rottura della gemma apicale ed in qualche caso un inizio di bottoni rosa. Poiché le prime infezioni di bolla avvengono solo in presenza di pioggia, e considerando che nessun fungicida è in grado di svolgere una attività curativa, il prossimo trattamento deve essere preventivo e posizionato il più vicino possibile alla prevista pioggia infettante. Per l'applicazione fungicida è quindi opportuno seguire le previsioni meteo e trattare solo in previsione di una pioggia. I prodotti utilizzabili sono quelli indicati nelle Linee Tecniche di Difesa Integrata (es. captano, ziram).

Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*): nelle varietà sensibili e dove nella scorsa stagione si sono verificate delle infezioni trattare con dei sali di rame. Questo trattamento può essere eseguito assieme a quello per la bolla.

ALBICOCCO – CILIEGIO – SUSINO – MANDORLO

Effettuare un primo trattamento preventivo con le sostanze attive previste nel Disciplinare di Produzione Integrata – Difesa e diserbo (rame, captano, ziram, dodina – quest'ultima impiegabile solo su ciliegio), preferendo l'applicazione di rame + ziram al primo trattamento e captano o dodina nei trattamenti successivi.

MELO - PERO

Cancri rameali: terminata la potatura è opportuno un trattamento con sali di rame.

ACTINIDIA

PSA: terminate le operazioni di potatura e legatura, e in previsione di una pioggia, è opportuno un trattamento preventivo con sali di rame, prima della pioggia.