**SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO**

U.O. Fitosanitario

# BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

# COLTURE FRUTTICOLE

***Bollettino n. 08 del 22/04/2026***

Le previsioni meteo indicano per i prossimi giorni un rialzo delle temperature e probabili piogge tra 6 – 7 giorni.

## PESCO

**Fase fenologica:** accrescimento dei frutticini.

**Oidio:** continuare con particolare attenzione la difesa antioidica, con zolfo o triazoli.

**Nerume** *(C. carpophilum):* la fase di maggior rischio va da inizio scamiciatura e si protrae per circa 30 giorni. Nelle situazioni a rischio intervenire con zolfo o pyraclostrobin.

**Afide verde:** in caso di infestazione procedere con un trattamento specifico utilizzando le diverse s.a. indicate nel DPI Veneto (https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata).

**Cydia molesta:** nelle trappole di monitoraggio le catture sono risultate numerose, oltre la soglia dei 30 esemplari/trappola/settimana. È anche iniziata la nascita delle prime larve. In particolari casi (con pressione alta) si può intervenire con clorantraniliprole o, in presenza dei primi sintomi, con larvicidi.

**Anarsia:** fitofago in aumento. Installare le trappole per il monitoraggio degli adulti.

**Batteriosi:** in caso di eventi piovosi porre attenzione soprattutto per le varietà più sensibili (non coperte da reti antigrandine) con prodotti rameici o con agenti di biocontrollo.

**Forficula:** mantenere monitorata la presenza per posizionare eventuali trattamenti per il contenimento

## ALBICOCCO

**Fase fenologica:** ingrossamento frutto.

**Nerume:** considerata la fase fenologica ancora favorevole alle infezioni, nelle situazioni in cui si il rischio è elevato, trattare con pyraclostrobin.

**Oidio:** le condizioni ambientali e lo stadio fenologico della coltura sono favorevoli alle infezioni oidiche. Continuare il controllo di questo patogeno utilizzando, nei trattamenti, zolfo (attivo anche contro il nerume) o le altre sostanze attive indicate nel DPI Veneto (https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata).

**Batteriosi:** ancora opportuno, per le varietà tardive, trattare con sali di rame (pianta asciutta). Utili anche *Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens.*

**Forficula:** mantenere monitorata la presenza per posizionare eventuali trattamenti per il contenimento

## SUSINO

**Fase fenologica:** accrescimento del frutto**.**

**Afidi (afide farinoso):** se presente intervenire con un trattamento specifico dopo caduta petali.

**C. funebrana:** fase di volo in calo, è in atto l'ovideposizione ed è prossima la nascita delle prime larve. In assenza della confusione sessuale, intervenire la prossima settimana con un trattamento ovolarvicida.

**Oidio/Nerume:** continuare la difesa con zolfo od IBE. Se necessario un contenimento più specifico per il nerume intervenire con pyraclostrobin, boscalid, dithianon.

# BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

## MELO

**Fase fenologica:** tra accrescimento dei frutti, per le varietà del gruppo Pink e la Granny Smith, e fine fioritura per la morgenduft.

**Ticchiolatura:** al momento non si segnalano sintomi della malattia segno che la difesa fin qui adottata è stata efficace. In previsione delle prossime piogge, mantenere un'adeguata protezione con le sostanze attive a disposizione da utilizzare sempre in chiave preventiva.

**Oidio:** rischio molto alto, si segnala la presenza della malattia in qualche meleto. Attuare una difesa specifica, oltre alle s.a. utilizzate per la ticchiolatura e efficaci contro l'oidio, anche con zolfo, bupirimate, ciflufenamid.

**Afide grigio:** dove non ancora eseguito è il momento di effettuare il trattamento post-fiorale utilizzando una delle diverse sostanze attive a disposizione. Curare molto bene la bagnatura della chioma.

**Cydia pomonella:** continua il volo degli adulti, monitorare la situazione nel frutteto con le apposite trappole.

**Eulia:** iniziata l'ovideposizione. È un fitofago in aumento, da tenere sotto controllo con un monitoraggio attento. Nei siti ritenuti a rischio verificare la presenza delle ooplacche e, se presenti, effettuare il trattamento insetticida (ovo-larvicida). Si ricorda che contro questo fitofago il *B. thuringiensis* è molto efficace.

**Litocollette:** in numerose zone si osserva un aumento delle popolazioni di questo fillominatore. Installare le apposite trappole sessuali per monitorare la situazione nel proprio frutteto.

## PERO

**Fase fenologica:** tra allegagione ed accrescimento dei frutti.

**Ticchiolatura:** il pero si trova ancora nella fase fenologica sensibile. Prestare la massima attenzione e mantenere costante la copertura della vegetazione usando i prodotti a disposizione indicati nel DPI Veneto (https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata), in particolare prima delle piogge.

**Maculatura bruna:** nelle varietà sensibili alla maculatura (Abate), è il momento di attivare la consueta difesa fungicida.

**Tentredine** *(Oplocampa brevis):* ancora possibile, nei frutteti colpiti da tentredine negli ultimi anni o con catture sulle trappole cromotropiche, trattare con acetamiprid o flupyradifurone (attivi anche contro gli afidi).

**Maculatura:** nelle varietà sensibili (Abate) è il momento di attivare la consueta difesa fungicida.

**Psilla:** adulti di prima generazione in piena attività di ovideposizione. In questa fase interventi con caolino, da ripetere sino a metà maggio sono un buon deterrente per l'ovideposizione. Anche il rilascio di antocoridi da inizio a fine maggio rappresenta una tecnica di difesa efficace ed ormai consolidata.

## ACTINIDIA

**Fase fenologica:** generalmente in pre-fioritura.

**PSA:** mantenere la difesa con sali di rame in particolare prima delle piogge, e con induttori di resistenza come l'acybenzolar-s-metil (s.a. autorizzata per uso di emergenza ai sensi dell'art. 53 del Reg. CE 1107/2009 dal 6 marzo al 3 luglio 2026) o laminarina. Per l'asportazione della vegetazione infetta attendere fino a quando le condizioni ambientali (caldo e secco) elimineranno il rischio di trasmissione delle infezioni.