SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO

U.O. Fitosanitario

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 09 del 30/04/2026

Le previsioni meteo indicano per i prossimi giorni un abbassamento delle temperature e probabili piogge tra 6–7 giorni.

PESCO

Stadio fenologico pesco (SFR Veneto - 29/04/2026)

Fase fenologica: differenziazione dei frutticini, in veloce accrescimento.

Oidio: continuare con particolare attenzione la difesa antioidica, utilizzando zolfo o triazoli.

Nerume *(C. carpophilum):* la coltura è ancora nello stadio sensibile. Nelle situazioni ritenute a rischio intervenire con zolfo o pyraclostrobin.

Batteriosi: le temperature miti e l'elevata umidità sono molto favorevoli alla malattia. Prima delle prossime piogge intervenire utilizzando prodotti a base di *Bacillus amyloliquefaciens* e/o *B. subtilis.* Possibile l'impiego di rame ma con le dovute cautele, soprattutto le temperature dovessero subire un calo

Afide verde: segnalati numerosi focolai in diversi frutteti. Dove necessario procedere con un trattamento aficida specifico utilizzando una delle diverse s.a. indicate nel Disciplinare Produzione Integrata regionale.

Cydia molesta: lo sfarfallamento degli adulti del primo volo sta terminando. La nascita larvale è iniziata ed è in aumento. Negli impianti con alta pressione e con superamento di 30 esemplari a trappola, si consiglia di intervenire, se non già fatto, in questi giorni con clorantraniliprole. Nei casi di pressione bassa si può intervenire, dopo aver valutato la presenza reale, con un larvicida.

Anarsia: fitofago in aumento. Installare le trappole per il monitoraggio degli adulti.

Forficula: sono iniziate le catture, anche piuttosto numerose. Continuare a monitorarne la presenza e la relativa risalita verso i frutticini. Utile la colla entomologica da applicare sulle piante a 40/50 cm da terra e da rinnovare dopo alcune settimane quando viene a calare il suo potere collante. Quando necessario si può intervenire con spinosad o lambda-cialotrina.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ALBICOCCO

Stadio fenologico albicocco (SFR Veneto 29/04/2026)

Fase fenologica: la coltura è allo stadio di accrescimento frutticini

Nerume: considerata la fase fenologica ancora favorevole alle infezioni, nelle situazioni in cui si il rischio è elevato, trattare con pyraclostrobin.

Oidio: le condizioni ambientali e lo stadio fenologico della coltura sono favorevoli alle infezioni oidiche. Continuare il controllo di questo patogeno utilizzando, nei trattamenti, zolfo (attivo anche contro il nerume) o le altre sostanze attive indicate nelle LTDI.

Apiognomonia: nelle situazioni a rischio intervenire con mefentrifluconazolo. Considerare che lo zolfo ha comunque un'azione collaterale significativa

Forficula: vedi pesco.

SUSINO

Stadio fenologico susino (SFR Veneto - 29/04/2026)

Fase fenologica: accrescimento frutti, molto veloce nelle varietà cino-giapponesi.

Afidi (afide farinoso): se presente intervenire con un trattamento specifico.

C. funebrana: è terminato il volo ed è iniziata la nascita delle primissime larve. Negli impianti che hanno storicamente una pressione elevata dell'insetto, e dove le catture nelle trappole superano il numero di 10 individui a trappola a settimana, intervenire con prodotti a base di clorantraniliprole.

Oidio/Nerume: continuare la difesa con zolfo od IBE. Se necessario un contenimento più specifico per il nerume intervenire con pyraclostrobin, boscalid, dithianon.

Batteriosi: come per il pesco, prima di eventuali piogge utilizzare prodotti a base di *Bacillus amyloliquefaciens* e/o *B. subtilis.* Possibile l'impiego di rame con le dovute cautele se si abbassano le temperature minime.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

CILIEGIO

Fase fenologica: fase fenologica da accrescimento frutto fino ad inizio invaiatura, per le varietà più precoci.

Monilia: al verificarsi di condizioni favorevoli alla malattia, e comunque prima delle prossime piogge, effettuare un trattamento specifico.

Cimice asiatica: monitorare la presenza nel ciliegeto e, in caso di presenza, trattare con una delle sostanze autorizzate allo scopo.

Afidi: continuare le osservazioni nel frutteto e alla comparsa dei primi focolai intervenire con un aficida specifico.

Stadio fenologico ciliegio (SFR Veneto - 29/04/2026)

MELO

Fase fenologica: fase fenologica di accrescimento frutticini, differenziato in base alla località e alle varietà.

Ticchiolatura: in qualche frutteto sono comparsi i sintomi delle infezioni di metà aprile.

Prevista un'infezione importante in prossimità delle piogge della prossima settimana. Continuare la difesa utilizzando i diversi prodotti di copertura disponibili: è ancora consigliabile l'uso delle s.a. appartenenti alla famiglia degli SDHI, seguendo le indicazioni previste in etichetta.

Stadio fenologico melo (SFR Veneto - 29/04/2026)

Oidio: sintomi della malattia diffusi ed in aumento. Continuare con attenzione la difesa utilizzando, oltre ai prodotti utilizzati per la ticchiolatura ed efficaci anche contro l'oidio, anche mefentifluconazolo, difeconazolo, penconazolo, cyflufenamid, fluxapyroxad, fluopyram, ecc.

Cydia pomonella: nella zona ovest della Regione continua il volo ed è iniziata l'ovideposizione. Nella zona est della Regione il volo è appena iniziato o è prossimo all'inizio.

Da questo fine settimana inizia il periodo corretto per il posizionamento di un prodotto ovo-larvicida come il clorantraniliprole, momento da valutare in base alle catture effettuate e alla pressione dell'infestazione.

Afide lanigero: è in deciso aumento la migrazione delle neanidi, dal colletto alla chioma. È questo il momento per applicare prodotti come sali potassici di acidi grassi, saponi molli, olio di arancio, da distribuire con alti volumi di bagnatura. Se però le colonie nella chioma sono già numerose si può decidere di effettuare un trattamento aficida specifico. In ogni caso cercare di areare bene le piante con qualche intervento di potatura sulle piante molto rigogliose, per favorire il passaggio di luce ed aria.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

PERO

Fase fenologica: fase di accrescimento frutticini.

Ticchiolatura: per ora non si notano sintomi della malattia, tuttavia la difesa deve continuare perché persiste il periodo sensibile alle infezioni.

Maculatura bruna: nelle varietà sensibili alla malattia inizia il periodo più sensibile. La difesa preventiva può essere fatta utilizzando, ad esempio, fluazinam, fosetil di alluminio (utile anche per la necrosi delle gemme), fosfito di K in miscela con dithianon o fluazinam, ciprodynil in miscela con fluopyram, fluopyram in miscela con fosetil di alluminio. In quei (pochi) impianti dove la pressione del patogeno è ancora alta si consiglia la lavorazione interfilare del cotico per l'intera annata.

Stadio fenologico pero (SFR Veneto - 29/04/2026)

Erwinia amylovora: qualche ritrovamento di germogli e frutti infetti. Fare molta attenzione alle rifioriture: trattare con laminarina, oppure con i diversi BCA. Asportare i germogli infetti.

Psilla: presenza di adulti, in fase di ovideposizione. In questo stadio fenologico un intervento con caolino deprime l'ovideposizione. Anche il rilascio di antocoridi da inizio a fine maggio rappresenta una tecnica di difesa efficace ed ormai consolidata.

NOCE

Fase fenologica: Var. LARA - sviluppo germogli (BBCH 12-13) - inizio fioritura: fiore femminile BBCH 610-630, fiore maschile BBCH 610-670.

Carpocapsa: raggiunta la sommatoria termica di 210-250° giorno, più bassa nelle zone verso il mare, più alta all'interno.

La prima cattura è stata effettuata al raggiungimento di 170° giorno (27 aprile).

Stadio fenologico noce (Antonio Fiorin - 29/04/2026)

Batteriosi: L'assenza di piogge delle ultime settimane, accompagnate da temperature notturne piuttosto fresche hanno mantenuto il rischio di infezione moderato da batteriosi *(Xanthomonas juglandis).* Al momento su Lara non sono visibili attacchi di batteriosi su foglia.

NAB: con l'inizio della fioritura inizia la suscettibilità della noce alla Necrosi Apicale Bruna, causata da funghi del genere Alternaria, Fusarium e Colletotrichum.

La maggior parte delle aziende hanno effettuato il trattamento nei giorni scorsi con Rame + Solfato di Zn + Captano con l'aggiunta di Tebuconazolo in quanto in fase di fioritura la noce diventa sensibile agli agenti della Necrosi Apicale Bruna.

Afidi: presenza sporadica in qualche noceto.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ACTINIDIA

Fase fenologica: inizio fioritura delle piante maschili per *A.chinensis*, stadio di fiori separati per *A. deliciosa.*

PSA: mantenere la difesa con sali di rame, in particolare prima delle piogge, induttori di resistenza come l'Acybenzolar-s-metil o laminarina. Per l'asportazione della vegetazione infetta attendere fino a quando le condizioni ambientali (caldo e secco) elimineranno il rischio di trasmissione delle infezioni.

Botrite: in particolare per le varietà gialle, al 30% dei fiori aperti intervenire utilizzando una delle s.a. previste nelle LTDI.

Aggiornamento cimice asiatica

- Continua l'uscita degli adulti di cimice asiatica dai siti di svernamento; nelle scorse annate questa fase si è protratta fino a giugno.
- In calo il numero di adulti catturati dalle trappole.
- Sono stati osservati adulti in accoppiamento; a breve si prevede l'inizio della fase di ovideposizione
- E' consigliato il posizionamento dei sistemi di cattura massale in prossimità di potenziali siti di svernamento.





DAFNAE Dipartimento di Agronomia, Alimenti, Risorse naturali, Animali e Ambiente

Università degli Studi di Padova