SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO

U.O. Fitosanitario

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 11 del 14/05/2026

Le previsioni meteo indicano per i prossimi giorni un abbassamento delle temperature alle medie del periodo ed altre piogge.

PESCO

Fase fenologica: accrescimento dei frutticini.

Oidio: continuare con particolare attenzione la difesa antioidica, utilizzando zolfo o triazoli.

Nerume *(C. carpophilum):* la coltura è ancora nello stadio sensibile. Nelle situazioni ritenute a rischio intervenire con zolfo o pyraclostrobin.

Batteriosi: le temperature miti dei prossimi giorni e l'elevata umidità, conseguenza delle ultime piogge, sono molto favorevoli alla malattia. Prima delle prossime piogge intervenire utilizzando prodotti a base di *Bacillus amyloliquefaciens* e/o *B. subtilis.* Possibile l'impiego di rame ma con le dovute cautele, soprattutto le temperature dovessero subire un calo.

Monilia: nelle varietà a maturazione precoce siamo quasi ad indurimento del nocciolo. Raggiunta questa fase è importante un intervento contro la monilia per evitare le infezioni latenti da parte di *M. fructicola*.

Afide verde: si conferma particolare difficoltà della stagione nel controllo di questo afide e sono segnalati ancora numerosi focolai in diversi frutteti. In questi casi procedere con un trattamento aficida specifico utilizzando una delle diverse s.a. indicate nel Disciplinare Produzione Integrata Veneto.

Cydia molesta: lo sfarfallamento del primo volo è terminato. Continua la nascita larvale. Negli impianti con alta pressione eventualmente ripetere un trattamento con un insetticida ad azione larvicida.

Anarsia: continua il volo ed è prossima l'ovideposizione. Continuare il monitoraggio per valutare l'opportunità di un trattamento specifico (soglia: 7 catture / trappola/settimana - 10 catture / trappola / due settimane).

Forficula: controllare le risalite e la presenza di forficula sulle piante con le trappole o il frappage. Mantenere l'erba del sottofila tagliata sembra contribuire a ridurre le infestazioni. Quando necessario trattare con spinosad e lambdacialotrina.

Limacce: in alcune zone si registrano danni causati da questi gasteropodi. Le condizioni climatiche piovose continuano ad essere favorevoli alla loro presenza: dove necessario si consiglia di continuare ad impiegare il fosfato ferrico.

ALBICOCCO

Fase fenologica: la coltura è allo stadio di accrescimento dei frutticini.

Oidio/Nerume: le condizioni ambientali e lo stadio fenologico della coltura sono favorevoli alle infezioni oidiche. Continuare il controllo di questo patogeno utilizzando, nei trattamenti, zolfo (attivo anche contro il nerume) o le altre s.a. indicate nel Disciplinare Produzione Integrata Veneto.

Forficula: vedi pesco.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

SUSINO

Fase fenologica: fase di accrescimento frutti.

C. funebrana: continua la nascita delle larve. In caso di presenza di danno intervenire con un prodotto ad azione larvicida.

Oidio/Nerume: continuare la difesa con zolfo od IBE. Se necessario un contenimento più specifico per il nerume intervenire con pyraclostrobin, boscalid, dithianon.

CILIEGIO

Fase fenologica: fase fenologica da accrescimento frutto fino a raccolta, per le varietà più precoci.

Monilia: prima delle prossime piogge, effettuare un trattamento specifico, facendo attenzione al rispetto dei tempi di carenza del prodotto.

Drosofila: clima ideale per lo sviluppo della specie. Le femmine svernanti hanno ormai completato l'ovideposizione e si notano le nascite della prima generazione. È questa una fase vulnerabile per questa specie perché la densità di popolazione è la più bassa e quindi ed il suo contenimento è più efficace. È quindi importante utilizzare tutti i mezzi (agronomici, meccanici, chimici) per limitare lo sviluppo del fitofago e ritardare il più possibile la fase esponenziale del fitofago.

MELO

Fase fenologica: fase fenologica di accrescimento dei frutticini.

Ticchiolatura: in generale la situazione non mostra preoccupazione, anche se in alcuni frutteti si segnalano dei sintomi. Con le piogge di questi giorni si è esaurito l'inoculo svernante e quindi le infezioni primarie. Continuare la difesa utilizzando i diversi prodotti di copertura disponibili.

Oidio: continuare con attenzione la difesa utilizzando, oltre ai prodotti utilizzati per la ticchiolatura ed efficaci anche contro l'oidio, come zolfo, mefentrifluconazolo, difenoconazolo, penconazolo, cyflufenamid.

Cydia pomonella: il volo degli adulti è verso la fine. Continua la deposizione delle uova e sono nate le prime larve. È il momento corretto per il posizionamento del secondo intervento ovo-larvicida.

Afide lanigero: continua la migrazione delle neanidi, dal colletto alla chioma. Utili, in questo momento, l'applicazione di prodotti come sali potassici di acidi grassi, saponi molli, olio di arancio, da distribuire con alti volumi di bagnatura. Se però le colonie nella chioma sono già numerose, effettuare un trattamento aficida specifico, utile anche per eliminare eventuali focolai di afide grigio.

Afide grigio: afide grigio presente in focolai in diversi frutteti, di non facile contenimento. Per l'eventuale intervento impiegare sostanze attive che possiedano una buona azione sistemica.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

PERO

Fase fenologica: fase di accrescimento frutticini.

Maculatura bruna: continuare la difesa con le s.a. indicate nel Disciplinare Produzione Integrata Veneto.

Psilla: popolazione in crescita, con nascite e presenza di neanidi, anche con produzione di melata.

Dove necessario effettuare dei con lavaggi mattutini con sapone molle e bicarbonato di potassio.

NOCE

Fase fenologica: sviluppo germogli, fine fioritura/allegagione (BBCH 670-71).

Danni da grandine: le piogge e le grandinate degli scorsi giorni hanno causato lesioni sia sui nuovi germogli che sulle piccole noci. Tale condizione è favorevole allo sviluppo di batteriosi *(Xanthomonas juglandis)* e di funghi *(Alternaria, Fusarium, Colletotrichum).*

Sintomi di antracnosi su noce (Antonio Fiorin - 13/05/2026)

Antracnosi: presenza sporadica di sintomi

Carpocapsa: raggiunta la sommatoria termica di 300-320° giorno, più bassa nelle zone verso il mare, più alta nelle zone interne. La prima cattura è stata effettuata al raggiungimento di 170° giorno, il 27 aprile. Le catture continuano sotto soglia (2 per trappola/giorno), tranne nelle aziende che hanno avuto danni lo scorso anno o che non si avvalgono della confusione sessuale.

Danni da grandine su noce (Antonio Fiorin - 13/05/2026)

Afidi: si nota la presenza sulle foglie, con inizio di presenza di melata negli appezzamenti più colpiti.

Sono consigliati trattamenti a base di rame per il controllo della batteriosi e la disinfezione delle ferite da grandine, in miscela con Tebuconazolo e con Boscalid+Pyraclostrobin per il contenimento di Alternaria, Fusarium e Colletotrichum.

ACTINIDIA

Fase fenologica: fine fioritura *A.chinensis*, inizio fioritura in *A. deliciosa.*

PSA: mantenere la difesa con sali di rame (da evitare in fioritura), in particolare prima delle piogge, induttori di resistenza come l'Acybenzolar-s-metil o laminarina. Per l'asportazione della vegetazione infetta attendere fino a quando le condizioni ambientali (caldo e secco) elimineranno il rischio di trasmissione delle infezioni.

Botrite: nel kiwi verde e dove ritenuto necessario per la storicità del sito, al 30% dei fiori aperti intervenire utilizzando una delle s.a. indicate nel Disciplinare Produzione Integrata Veneto.

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO

U.O. Fitosanitario

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

Cimice asiatica: continua l'uscita degli adulti di cimice asiatica dai siti di svernamento che ha ormai coinvolto più del 80% della popolazione. Le catture di adulti sono tornate a salire; sono state osservate ovideposizioni ed il modello prevede già le prime nascite. È ancora il momento di posizionare i sistemi di cattura massale in prossimità di potenziali siti di svernamento. Si raccomanda inoltre di effettuare il monitoraggio periodico dei frutteti per individuare i primi adulti presenti ed effettuar ei trattamenti necessari.

Aggiornamento cimice asiatica

- ❑ Continua l'uscita degli adulti dai siti di svernamento; nelle scorse annate questa fase si è protratta fino a giugno.
- ❑ Nell'ultima settimana sono diminuiti gli adulti catturati dalle trappole.
- ❑ Attualmente è in corso la fase di ovideposizione.
- ❑ E' consigliato il posizionamento dei sistemi di cattura massale in prossimità di potenziali siti di svernamento.



DAFNAE Dipartimento di Agronomia, Alimenti, Risorse naturali, Animali e Ambiente

Università degli Studi di Padova