SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO

U.O. Fitosanitario

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 13 del 28/05/2026

Maculatura bruna del pero: con Decreto del Direttore dell'UO Fitosanitario n. 13127 del 29/04/2026 è stata approvata la deroga per motivati problemi fitosanitari all'Ecoschema 2 "Inerbimento delle colture arboree" per l'eliminazione del cotico erboso interfilare. Link al Decreto 13127 del 29/04/2026.

Alla pagina web https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata è pubblicato il **testo consolidato al Disciplinare** di Produzione Integrata del Veneto - Difesa e Diserbo - Norme Specifiche per Coltura.

Continua il periodo caldo e con assenza di precipitazioni significative.

PESCO

Fase fenologica: accrescimento frutti. Si segnala una buona potenzialità produttiva ed un buon calibro nelle varietà a maturazione medio/precoce

Oidio: continuare con particolare attenzione la difesa antioidica, utilizzando zolfo o triazoli.

Batteriosi: le condizioni climatiche del periodo sono ancora favorevoli alla malattia. Nelle varietà sensibili continuare la difesa utilizzando prodotti a base di *Bacillus amyloliquefaciens* e/o *B. subtilis.* Possibile l'impiego di rame ma con le dovute cautele, soprattutto le temperature dovessero subire un calo.

Monilia: raggiunta la fase di indurimento del nocciolo effettuare un intervento contro la monilia, per evitare le infezioni latenti da parte di *M. fructicola.*

Anarsia: è terminato il volo degli adulti, continua la nascita delle larve. Superata la soglia, o se per storicità il frutteto ha avuto danni da anarsia, intervenire con sostanze larvicide.

Cydia molesta: è iniziato il secondo volo dell'anno. Programmare a breve un trattamento con un prodotto ovo-larvicida

Forficula: presenza in aumento con danni sui frutticini. Controllare le risalite e la presenza di forficula sulle piante con le trappole o il frappage. Quando necessario trattare con spinosad e lambdacialotrina.

ALBICOCCO

Fase fenologica: iniziata la raccolta delle varietà precoci.

Oidio: continuare il controllo di questo patogeno utilizzando, nei trattamenti, zolfo o le altre sostanze attive indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata del Veneto.

Forficula: vedi pesco

Batteriosi: vedi pesco

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

SUSINO

Fase fenologica: fase di accrescimento frutti.
Oidio/Nerume: continuare la difesa con zolfo od IBE.
Batteriosi: vedi pesco

CILIEGIO

Fase fenologica: fase fenologica da accrescimento frutto - raccolta.
Monilia: nelle situazioni ritenute a rischio, effettuare un trattamento specifico in pre raccolta, facendo attenzione al rispetto dei tempi di carenza del prodotto.
Drosofila: le alte temperature deprimono il fitofago, specie in pianura, dove per il momento la pressione della drosofila è molto diminuita. Diversa la situazione per la collina, dove le temperature più fresche favoriscono l'attività del fitofago. Sono utilizzabili s.a. quali cyantraniliprole, acetamiprid, e piretroidi in prossimità della raccolta.
Forficula: si segnalano danni significativi in molti areali produttivi.

MELO

Fase fenologica: fase fenologica di accrescimento dei frutticini.
Ticchiolatura: sono terminate le infezioni primarie segnalate, tuttavia si notano sintomi di infezioni in alcuni frutteti. Continuare la difesa contro le infezioni secondarie, utilizzando i diversi prodotti di copertura disponibili.
Oidio: elevato il rischio di infezioni. Continuare con attenzione la difesa utilizzando le sostanze attive indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata del Veneto.
Cydia pomonella: terminata la prima generazione. Continua la nascita delle ultime larve. Eseguito il secondo intervento con clorantraniliprole, attendere per valutare l'efficacia.
Afide lanigero: la migrazione delle neanidi è praticamente finita. Popolazione presente sulla parte alta delle piante più rigogliose. Oltre al trattamento specifico con aficida, risultano efficaci anche lavaggi con alti volumi di soluzione con olio essenziale di arancio o saponi molli

PERO

Fase fenologica: fase di accrescimento frutticini.
Maculatura bruna: continuare la difesa con le sostanze attive previste nel Disciplinare di Produzione Integrata del Veneto.
Psilla: situazione diversificata, con frutteti puliti ed altri con problemi non indifferenti. In questi casi intervenire con lavaggi mattutini a base di bicarbonato di K, sapone molle, sali potassici di acidi grassi.
Cimice asiatica: in aumento la presenza, da monitorare con attenzione. Se necessario intervenire con acetamiprid sulle file perimetrali o a file alterne.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ACTINIDIA

Fase fenologica: accrescimento per *A. chinensis,* allegagione in *A. deliciosa.*

PSA: macchie da batteriosi presenti su foglia in qualche impianto. Il clima attuale riduce notevolmente la virulenza del batterio, al momento non sono necessari ulteriori trattamenti. Asportare dal frutteto tutti i rami o parti di cordone colpiti e disseccati da Psa.

Cimice asiatica: presenza di ovature e relative nascite di cimice asiatica in aumento in diverse zone.
Se necessario, trattare con etofenprox.

NOCE

Fase fenologica: BBCH 71-75-77 - Sviluppo germogli, allegagione, ingrossamento.

Carpocapsa: Raggiunta la sommatoria termica di 400° giorno, più bassa nelle zone verso il mare, più alta all'interno. Fase di nascita delle larve e penetrazione nei frutti. Catture sotto soglia (2 per trappola/giorno). In alcune aziende che hanno avuto problemi l'anno scorso o che non si avvalgono della confusione sessuale, le catture sono più abbondanti (sopra soglia).

Batteriosi e malattie fungine: le grandinate del 11-12 maggio hanno creato lesioni importanti sia sui germogli che sui giovani frutti. Tale condizione è favorevole allo sviluppo di Batteriosi *(Xanthomonas juglandis)* e di funghi *(Alternaria, Fusarium* e *Colletotrichum).* In alcune situazioni (circoscritte) si nota la presenza di sintomi di batteriosi *(X. juglandis)* in corrispondenza dell'apice fiorale. Intervenire con rame (controllo batteriosi e disinfezione danni da grandine) in miscela con Boscalid+Pyraclostrobin oppure Dithianon oppure Fluazinam (per controllo *Alternaria, Fusarium* e *Colletotrichum*).

Afidi: continua la presenza di afidi sia sulla pagina inferiore che superiore delle foglie. In alcuni casi stanno portando alla formazione di abbondante melata che, con alte temperature, può diventare causa di scottature sui frutti.

Antracnosi: si segnala la presenza sporadica di sintomi.

Cimice asiatica: terminata l'uscita degli adulti di cimice asiatica dai siti di svernamento. Le catture di adulti sono ancora numero molto inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Si raccomanda inoltre di effettuare il monitoraggio periodico dei frutteti per individuare i primi adulti presenti ed effettuare i trattamenti necessari.

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO

U.O. Fitosanitario

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

Aggiornamento cimice asiatica

- Continua l'uscita degli adulti dai siti di svernamento; nelle scorse annate questa fase si è protratta fino a giugno.
- Nell'ultima settimana sono in lieve aumento gli adulti catturati dalle trappole.
- Attualmente è in corso la fase di ovideposizione. Si osserva anche una scarsa presenza di neanidi.
- E' consigliato il posizionamento dei sistemi di cattura massale in prossimità di potenziali siti di svernamento.



DAFNAE Dipartimento di Agronomia, Alimenti, Risorse naturali, Animali e Ambiente

Università degli Studi di Padova