

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 14 del 03/06/2026

Alla pagina web <https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata> è pubblicato il testo consolidato del Disciplinare di Produzione Integrata del Veneto - Difesa e Diserbo - Norme Specifiche per Coltura.

Per i prossimi giorni sono previste temperature più miti, in linea con la media del periodo, ed una sostanziale assenza di piogge.

PESCO

Fase fenologica: indurimento del nocciolo e inizio raccolta per le varietà precoci.

Oidio: continuare con particolare attenzione la difesa antioidica, utilizzando zolfo o triazoli.

Monilia: dove non ancora eseguito, raggiunta la fase di indurimento del nocciolo ed al fine di evitare le infezioni latenti da parte di *M. fructicola*, effettuare un intervento contro monilia.

Cydia molesta: continua il secondo volo dell'anno, con relativa ovideposizione e nascita delle larve. È il momento per applicare un prodotto ad azione ovo-larvicida, efficace anche nei confronti di eventuali larve di anarsia ancora presenti

P. comstocki: presente in maniera limitata, va però tenuto sotto controllo per evitarne la diffusione. In questo momento la popolazione è composta da giovani di 1° e 2° età. Dove presente è utile intervenire con pyriproxyfen, spirotetramat o maltodestrina.

Forficula: presenza in aumento con danni sui frutticini. Controllare le risalite e la presenza di forficula sulle piante con le trappole o il frapping. Quando necessario trattare, la sera o al mattino presto, con spinosad e lambdacialotrina.

ALBICOCCO

Fase fenologica: accrescimento dei frutti, iniziata la raccolta delle varietà precoci.

Oidio: continuare il controllo di questo patogeno utilizzando, nei trattamenti, zolfo o le altre sostanze attive indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata del Veneto.

Monilia: con condizioni favorevoli alle infezioni, ad invaiatura e pre-raccolta intervenire con prodotti specifici, ponendo attenzione ai tempi di carenza.

Forficula: stesse considerazioni fatte per il pesco. Mantenere monitorata la presenza per posizionare eventuali trattamenti per il contenimento. Le sostanze attive utilizzabili sono lambda-cialotrina e spinosad.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

CILIEGIO

Fase fenologica: fase fenologica da accrescimento frutto - raccolta.

Monilia: nelle situazioni ritenute a rischio, effettuare un trattamento specifico in pre raccolta, facendo attenzione al rispetto dei tempi di carenza del prodotto.

Drosophila: l'abbassamento termico favorisce lo sviluppo della specie ed in campo si osserva un veloce incremento delle popolazioni e primi danni su frutto. Dall'invasatura in poi intervenire con le molecole disponibili. Porre massima attenzione alle ciliegie non raccolte che rappresentano un'importante fonte di inoculo: asportarle dal campo o, se rimaste sull'albero, trattarle come le altre.

MELO

Fase fenologica: fase fenologica di accrescimento dei frutticini.

Ticchiolatura: continuare la difesa contro le infezioni secondarie, utilizzando i diversi prodotti di copertura disponibili, intervenendo sempre prima delle piogge.

Oidio: si mantiene elevato il rischio di infezioni. Continuare con attenzione la difesa utilizzando le sostanze attive indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata del Veneto.

Cydia pomonella: il volo degli adulti è in fase calante. Le ovideposizioni sono praticamente terminate, e prosegue la nascita delle larve. In alcune situazioni nelle trappole si catturano ancora degli adulti, anche in numero consistente. Si tratta sempre di individui svernanti, ancora del primo volo dell'anno. In questi casi monitorare i frutteti e, in caso di sintomi sui frutti, intervenire con un prodotto ad azione larvicida.

Eulia: è iniziato il secondo volo dell'anno. Monitorare la presenza, anche visivamente, per individuare le eventuali ooplacche e se necessario programmare un intervento specifico.

Afide lanigero: la migrazione delle neanidi è finita. Oltre al trattamento specifico con aficida, risultano efficaci anche lavaggi con alti volumi di soluzione con olio essenziale di arancio o saponi molli.

PERO

Fase fenologica: accrescimento frutti.

Maculatura bruna: continuare la difesa con le sostanze attive previste nel Disciplinare di Produzione Integrata del Veneto.

Psilla: le piogge di questi giorni hanno depresso la popolazione. Tuttavia esistono situazioni con una presenza significativa del fitofago. In questi casi intervenire con lavaggi mattutini a base di bicarbonato di K, sapone molle, sali potassici di acidi grassi.

Cimice asiatica: in aumento la presenza, da monitorare con attenzione. Se necessario intervenire con acetamiprid sulle file perimetrali o a file alterne.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ACTINIDIA

Fase fenologica: accrescimento sia per *A.chinensis* che per *A. deliciosa*.

PSA: il clima attuale riduce notevolmente la virulenza del batterio, al momento non sono necessari ulteriori trattamenti. Asportare dal frutteto tutti i rami o parti di cordone colpiti e disseccati da Psa.

Porre attenzione ai temporali estivi, specie se accompagnati da grandine. In questi casi l'abbassamento termico e le ferite favoriscono le infezioni da PSA: intervenire subito con un prodotto a base di sali di rame.

Cimice asiatica: è terminata l'uscita degli adulti di cimice asiatica dai siti di svernamento, le catture di adulti si confermano essere inferiori rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Continuare con il monitoraggio periodico dei frutteti per individuare i primi adulti presenti ed effettuare i trattamenti necessari.

Aggiornamento cimice asiatica

- ❑ Continua l'uscita degli adulti dai siti di svernamento; nelle scorse annate questa fase si è protratta fino a giugno.
- ❑ Nell'ultima settimana sono in aumento gli adulti catturati dalle trappole.
- ❑ Attualmente è in corso la fase di ovideposizione. Si cominciano ad osservare le prime ninfe.
- ❑ E' consigliato il posizionamento dei sistemi di cattura massale in prossimità di potenziali siti di svernamento.

