

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 15 del 11/06/2026

Per i prossimi giorni sono previste temperature più miti, in linea con la media del periodo, ed una sostanziale assenza di piogge.

PESCO

Fase fenologica: accrescimento dei frutti ed inizio raccolta per le varietà precoci.

Oidio: continuare la difesa antioidica, utilizzando zolfo o triazoli.

Monilia: nelle varietà a maturazione precoce effettuare un paio di interventi contro la monilia prima di iniziare la raccolta. Le sostanze efficaci disponibili sono diverse: importante alternare i meccanismi di azione e porre attenzione al tempo di carenza.

Cydia molesta: continua il secondo volo dell'anno, con relativa ovideposizione e nascita delle larve. Superata la soglia dei 10 adulti/settimana è opportuno intervenire con prodotti ad azione larvicida.

Forficula: presenza in aumento con danni sui frutti, soprattutto se vicini o raggruppati. Controllare le risalite e la presenza di forficula sulle piante con le trappole o il frapping. Quando necessario trattare, la sera o al mattino presto, con spinosad e lambdacialotrina.

ALBICOCCO

Fase fenologica: accrescimento dei frutti, iniziata la raccolta delle varietà precoci.

Forficula: stesse considerazioni fatte per il pesco.

Mantenere monitorata la presenza per posizionare eventuali trattamenti per il contenimento. Le sostanze attive utilizzabili sono lambdacialotrina e spinosad.

CILIEGIO

Fase fenologica: fase fenologica da accrescimento frutto - raccolta.

Drosophila: l'abbassamento termico ha favorito lo sviluppo della specie ed in campo si osserva un veloce incremento delle popolazioni, con gravi e diffusi danni su frutto. In questa situazione l'efficacia dei prodotti è limitata e la situazione in molti casi è ormai ingestibile.

Continuare con i trattamenti finché c'è la convenienza economica.

In ogni caso porre sempre attenzione massima alle ciliegie non raccolte che rappresentano una importante fonte di inoculo e che vanno trattate comunque come le altre.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

MELO

Fase fenologica: fase fenologica di accrescimento dei frutticini.

Ticchiolatura: continuare la difesa contro le infezioni secondarie, utilizzando i diversi prodotti di copertura disponibili, intervenendo sempre prima delle piogge. Nelle situazioni a rischio glomerella dare la preferenza a fluazinam, dithianon e captano. In altri casi la difesa può proseguire con bicarbonato di K o zolfo. Nelle situazioni a rischio prestare attenzione alla filloptosi causata da squilibri nutrizionali, intervenendo con gli opportuni interventi fogliari.

Oidio: ancora elevato il rischio di infezioni. Continuare con attenzione la difesa utilizzando le sostanze attive indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale.

Cydia pomonella: il volo degli adulti è praticamente al termine. In alcune situazioni nelle trappole si catturano ancora degli adulti, anche in numero consistente. Si tratta sempre di individui svernanti, ancora del primo volo dell'anno. Le ovideposizioni sono praticamente terminate, e prosegue la nascita delle larve. Nei frutteti dove prosegue la cattura di individui adulti e, in caso di sintomi sui frutti, intervenire con un prodotto ad azione larvicida.

Eulia: è iniziato il secondo volo dell'anno. Monitorare la presenza, anche visivamente, per individuare le eventuali ooplacche e se necessario programmare un intervento specifico.

Afide lanigero: rispetto al 2025 si nota una leggera diminuzione di presenza dell'afide. Dove necessario sono utili i lavaggi con olio essenziale di arancio e/o sapone molle. Un eventuale intervento chimico può essere necessario nei casi critici

PERO

Fase fenologica: accrescimento frutti.

Maculatura bruna: in qualche frutteto si osservano le prime tacche necrotiche su frutto, in particolare si riscontrano principalmente in terreni asfittici, con ristagni idrici e con il cotico erboso. La difesa deve proseguire, prima degli eventi piovosi, utilizzando le molecole previste nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale.

Psilla: le piogge di questi giorni hanno depresso la popolazione, che rimane sotto controllo. Tuttavia esistono situazioni con una presenza significativa del fitofago. In questi casi intervenire con lavaggi mattutini a base di bicarbonato di K, sapone molle, sali potassici di acidi grassi.

Cimice asiatica: in aumento la presenza, da monitorare con attenzione. Se necessario intervenire con acetamiprid sulle file perimetrali o a file alterne.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ACTINIDIA

Fase fenologica: accrescimento sia per *A. chinensis* che per *A. deliciosa*.

PSA: il clima attuale riduce notevolmente la virulenza del batterio, al momento non sono necessari ulteriori trattamenti. Asportare dal frutteto tutti i rami o parti di cordone colpiti e disseccati da *Psa*.

Porre attenzione ai temporali estivi, specie se accompagnati da grandine. In questi casi l'abbassamento termico e le ferite favoriscono le infezioni da *PSA*: intervenire subito con un prodotto a base di sali di rame.

NOCE

Fase fenologica: sviluppo germogli/ingrossamento frutto (BBCH 75-77).

Antracnosi: presenza di sintomi su foglia.

Batteriosi: presenza di sintomi su frutto. Le grandinate del 11/12 maggio e del primo giugno hanno creato lesioni importanti sia sui germogli che sui giovani frutti. Tale condizione è favorevole allo sviluppo della batteriosi, oltre che di funghi (*Alternaria*, *Fusarium* e *Colletotrichum*).

In alcune situazioni, piuttosto circoscritte, si nota la presenza di sintomi di batteriosi in corrispondenza dell'apice fiorale.

Cydia pomonella: Raggiunta la sommatoria termica di 550° giorno per quanto riguarda lo sviluppo della carpocapsa, più bassa nelle zone verso il mare, più alta all'interno. Siamo nella fase di nascita delle larve e penetrazione nei frutti. Il volo continua sotto soglia (2 per trappola/giorno), tranne nelle aziende che hanno avuto danni l'anno scorso o che non si avvalgono della confusione sessuale: in questi casi le catture sono più abbondanti e arrivano sopra la soglia di intervento, giustificando dei trattamenti ovo-larvicidi.

Afidi: continua la presenza di afidi sia sulla pagina inferiore che superiore delle foglie che in alcuni casi stanno portando alla formazione di abbondante melata che, in previsione delle alte temperature previste per i prossimi giorni, può diventare causa di scottature sui frutti.



Sintomi di batteriosi su frutto (Alessio Signori - 07/06/2026)

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

Cimice asiatica: in generale le catture di adulti sono in aumento su tutte le trappole. Sono presenti uova e individui giovani, oltre che adulti. Molte ovature risultano essere parassitizzate. Continuare con il monitoraggio periodico dei frutteti per verificare la necessità di eventuali trattamenti.

Aggiornamento cimice asiatica

- ❑ Nell'ultima settimana sono in aumento gli adulti catturati dalle trappole.
- ❑ Si cominciano ad osservare le prime ninfe.
- ❑ Si osservano numerose ovature parassitizzate.
- ❑ E' consigliato il posizionamento dei sistemi di cattura massale in prossimità di degli appezzamenti coltivati.

