

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 16 del 17/06/2026

Per i prossimi giorni son previste temperature in forte aumento ed assenza di piogge.

PESCO

Fase fenologica: accrescimento dei frutti e raccolta per le varietà precoci.

Monilia: effettuare i due trattamenti pre-raccolta. Le sostanze efficaci disponibili sono diverse: è importante alternare i meccanismi di azione e porre attenzione al tempo di carenza. In questa fase possono trovare utilizzo anche gli agenti di biocontrollo e le sostanze attive di origine naturale.

Cydia molesta: sono in aumento le catture degli adulti. Se superata la soglia di 10 catture a settimana, o in presenza di sintomi sui germogli, effettuare un trattamento con prodotti larvicidi (es.: spinosad, emamectina).

Forficula: continuano a verificarsi danni importanti specialmente sulle nettarine. Il controllo delle popolazioni si basa su interventi nelle ore dopo il tramonto con spinosad e lambdacialotrina.

ALBICOCCO

Fase fenologica: accrescimento dei frutti, iniziata la raccolta delle varietà precoci.

Forficula: stesse considerazioni fatte per il pesco.

Mantenere monitorata la presenza per posizionare eventuali trattamenti per il contenimento. Le sostanze attive utilizzabili sono lambdacialotrina e spinosad.

CILIEGIO

Fase fenologica: fase fenologica da accrescimento frutto - raccolta.

Drosophila: in molti siti il livello delle popolazioni è tale da rendere non più economicamente sostenibile continuare la coltivazione. In ogni caso è fondamentale raccogliere i frutti caduti a terra ed allontanarli dal frutteto. Inoltre è anche necessario continuare a trattare anche le ciliegie lasciate sulla pianta che rappresentano una grande fonte di inoculo. Nelle altre situazioni adottare una opportuna difesa con insetticidi nel rispetto dei tempi di carenza.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

MELO

Fase fenologica: fase fenologica di accrescimento dei frutticini.

Glomerella: iniziare la difesa specifica, dando la preferenza a fluazinam, dithianon e captano. Nelle situazioni a rischio prestare attenzione alla filloptosi causata da squilibri nutrizionali, intervenendo con gli opportuni interventi fogliari.

Oidio: ancora significativo il rischio di infezioni. Continuare con attenzione la difesa utilizzando le sostanze attive indicate nelle LTDI.

Cydia pomonella: è iniziato il secondo volo della stagione. L'eventuale prodotto ad azione ovicida va posizionato in questo fine settimana. Dalla prossima utilizzare insetticidi ad azione larvicida.

Eulia: nel caso le trappole abbiano segnalato la presenza del fitofago, verificare la presenza delle ooplacche e se necessario programmare un intervento specifico.

Afide lanigero: su piante molto rigogliose è in aumento la presenza dell'afide. In questi casi utili i trattamenti con pirimicarb, spirotetramat, sulfoxaflor o acetamiprid, in miscela con saponi molli. Importante garantire una buona bagnatura della chioma.

Scottature: con l'avanzare della stagione porre attenzione alle possibili scottature da sole. Curare l'irrigazione ed utilizzare prodotti schermanti.

PERO

Fase fenologica: accrescimento frutti.

Maculatura bruna: in leggero aumento le, piccole, necrosi esterne frutto provocate dalla maculatura bruna. Continuare la difesa sulle varietà sensibili con fludioxonil, fluopyram e fosetil in miscela, mefentrifluconazolo.

Psilla: rispetto alla settimana scorsa si segnala un aumento di impianti con presenza di melata, situazione che tenderà ad aggravarsi con l'aumento delle temperature. Lavaggi mattutini con sapone molle e bicarbonato espongono le neanidi alla disidratazione portandole a morte. Se si interviene con olio estivo attenzione a distanziarlo di almeno 15 giorni da trattamenti con captano, fluazinam, zolfo.

Cimice asiatica: aumento della presenza di adulti e qualche neanide appena nata. Tenere monitorata la popolazione. Con individui di 1° e 2° età sono efficaci sia il tebufenozide che il piretro naturale. Al fine di salvaguardare il più possibile gli antocoridi, acetamiprid e piretroidi di sintesi vanno usati solo se strettamente necessario. Prima di intervenire monitorare e valutare la situazione

ACTINIDIA

Fase fenologica: accrescimento sia per *A. chinensis* che per *A. deliciosa*.

PSA: vedi bollettino precedente.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

Cimice asiatica: la popolazione di adulti è stabile o in leggero calo mentre sono in aumento gli individui giovani. Continua la deposizione delle uova, molte delle quali sono parassitizzate. In generale si conferma la minore presenza di cimice rispetto agli anni passati. Continuare con il monitoraggio periodico dei frutteti per verificare la necessità di eventuali trattamenti.

Aggiornamento cimice asiatica

- ❑ Nell'ultima settimana gli adulti catturati dalle trappole sono in calo rispetto alla scorsa settimana. In leggero aumento le catture di giovani.
- ❑ Attualmente è in corso la fase di ovideposizione. Nei rilievi di campo si osservano numerose ovature parassitizzate.
- ❑ Si cominciano ad osservare le prime ninfe.
- ❑ E' consigliato il posizionamento dei sistemi di cattura massale in prossimità delle colture.

