

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 17 del 25/06/2026

Per i prossimi giorni son previste temperature in forte aumento ed assenza di piogge.

PESCO

Fase fenologica: accrescimento dei frutti e raccolta per le varietà medie-precoci.

Monilia: qualche frutto colpito si osserva nelle varietà in via di maturazione. Importante effettuare i due trattamenti pre-raccolta, a 15 e 7 giorni. Le sostanze efficaci disponibili sono diverse: è importante alternare i meccanismi di azione e porre attenzione al tempo di carenza. In questa fase possono trovare utilizzo anche gli agenti di biocontrollo e le sostanze attive di origine naturale.

Cydia molesta: lo sfarfallamento di secondo volo si avvia al termine, proseguono le ovideposizioni di seconda generazione e la nascita delle larve di seconda generazione (62-70%). Dove è stata superata la soglia delle 10 catture a settimana (per il momento rara) o in presenza di sintomi sui germogli effettuare un trattamento con prodotti larvicidi (es.: spinosad, emamectina).

A. linetaella: è iniziato il secondo volo dell'anno in alcune aree del Veneto. Monitorare la popolazione con le apposite trappole. La soglia indicativa per l'eventuale trattamento è di 7 catture/settimana o 10 in due settimane.

Forficula: continuano a verificarsi danni importanti specialmente sulle nettarine. Per il controllo delle popolazioni effettuare gli interventi nelle ore dopo il tramonto con spinosad o lambda-cialotrina.

ALBICOCCO

Fase fenologica: accrescimento dei frutti, iniziata la raccolta delle varietà precoci.

Forficula: stesse considerazioni fatte per il pesco. Mantenere monitorata la presenza per posizionare eventuali trattamenti per il contenimento. Le sostanze attive utilizzabili sono lambda-cialotrina e spinosad.

SUSINO

Fase fenologica: accrescimento dei frutti.

Cydia funebrana: continua il secondo volo dell'anno. Dove storicamente si presenta il problema in modo rilevante, e se le catture sono superiori a 10 esemplari a trappola settimana, effettuare un intervento larvicida specifico.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

MELO

Fase fenologica: fase fenologica di accrescimento dei frutticini.

Glomerella: le alte temperature, se unite a condizioni di bagnatura o elevata umidità, favoriscono le infezioni. Effettuare la difesa specifica, dando la preferenza a fluazinam, dithianon e captano. Anche il bicarbonato di potassio e zolfo sono risultati in grado di limitare la malattia.

Oidio: ancora significativo il rischio di infezioni. Continuare con attenzione la difesa utilizzando le sostanze attive indicate nelle LTDI.

Cydia pomonella: in gran parte della regione è iniziato il secondo volo e sulle trappole si hanno le prime catture; nella zona est della regione il volo deve ancora iniziare. Dove si hanno le catture, è il momento di iniziare la difesa usando il virus della granulosa o altre sostanze larvicide come emamectina-benzoato. In alternativa utile anche l'utilizzo di tebufenozide (quest'ultimo attivo anche sulle forme giovanili di cimice)

Eulia: nel caso le trappole abbiano segnalato la presenza del fitofago, verificare la presenza delle larve e se necessario programmare un intervento specifico.

Afide lanigero: su piante molto rigogliose è in aumento la presenza dell'afide. In questi casi utili i trattamenti dilavanti con saponi molli. Importante garantire una buona bagnatura della chioma.

Scottature: con l'avanzare della stagione porre attenzione alle possibili scottature da sole. Curare l'irrigazione ed utilizzare prodotti schermanti.

Metcalfa: segnalati i primi sintomi in alcuni frutteti.



Afide lanigero (SFR Veneto)

PERO

Fase fenologica: accrescimento frutti.

Maculatura bruna: presenza di piccole necrosi su frutto provocate dalla maculatura bruna. Continuare la difesa sulle varietà sensibili con le sostanze attive indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata.

Psilla: le condizioni climatiche del periodo favoriscono lo sviluppo del fitofago. Per il contenimento delle popolazioni sono efficaci i lavaggi mattutini per sciogliere la melata (e rendere vulnerabile l'insetto alle alte temperature) con bicarbonato di K e saponi molli potassici.

Cimice asiatica: presenza di adulti e qualche neanide appena nata. Tenere monitorata la popolazione. Con individui di 1° e 2° età sono efficaci sia il tebufenozide che il piretro naturale. Al fine di salvaguardare il più possibile gli antocoridi, acetamiprid e piretroidi di sintesi vanno usati solo se strettamente necessario. Prima di intervenire monitorare e valutare la situazione.



Pera con sintomo di maculatura bruna (Alfio Samassa, 23/06/2026)

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ACTINIDIA

Fase fenologica: accrescimento sia per *A. chinensis* che per *A. deliciosa*.

Cimice asiatica: ritrovamenti di ovature e neanidi di cimice di seconda età in aumento. Se necessario intervenire con etofenprox la mattina presto e bagnature appropriate.

Forficula: si notano numerose presenze di forficule nascoste tra i frutti. Al momento tale presenza non sembra essere causa di danni ai frutti.

NOCE

Fase fenologica: sviluppo germogli, ingrossamento frutto.

Carpocapsa: raggiunta la sommatoria termica di 750°-800° giorno, più bassa nelle zone verso il mare, più alta all'interno. Siamo prossimi all'inizio della seconda generazione (inizio a circa 883 gradi giorno).

Funghi e batteri: si rileva la presenza di sintomi di batteriosi, antracnosi e altri funghi (*alternaria*, *fusarium*, *colletotrichum*).

Rhagoletis completa: osservate le prime catture il 25 giugno nel veneziano.



Primi individui di Rhagoletis completa catturati il 25 giugno (Alessio Signori – 25/06/2026)

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

Cimice asiatica: la popolazione di adulti è in leggero calo mentre sono in aumento gli individui giovani. In generale si conferma la minore presenza di cimice rispetto agli anni passati. Continua la deposizione delle uova, molte delle quali sono parassitizzate. Continuare con il monitoraggio periodico dei frutteti per verificare la necessità di eventuali trattamenti.

Aggiornamento cimice asiatica

- ☐ Nell'ultima settimana, il numero di adulti catturati dalle trappole è inferiore rispetto alle settimane precedenti.
- ☐ Le catture delle forme giovanili sono in aumento.
- ☐ Si osservano tutte le età degli stadi giovanili, comprese le ninfe.
- ☐ E' ancora in corso la fase di ovideposizione. Nei rilievi di campo si osservano numerose ovature parassitizzate.

