

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 18 del 01/07/2026

Per i prossimi giorni sono previste temperature in calo che dovrebbero assestarsi su valori tipici delle media del periodo.

PESCO

Fase fenologica: accrescimento dei frutti e raccolta

Monilia: si ricorda l'importanza dei trattamenti preraccolta (-7,-3 gg), impiegando sostanze attive compatibili con il rispetto dei tempi di carenza (es. mandestrobin, mefentrifluconazolo, fenpyrazamine, fluopyram). In questa fase possono trovare utilizzo anche gli agenti di biocontrollo e le sostanze attive di origine naturale.

Cydia molesta: lo sfarfallamento di secondo volo è terminato ed è iniziato il terzo. Praticamente terminate anche le ovideposizioni di seconda generazione. Prosegue la nascita delle larve di seconda e terza generazione. Dove è stata superata la soglia delle 10 catture a settimana (per il momento rara) o in presenza di sintomi sui germogli effettuare un trattamento con prodotti larvicidi (es.: spinosad, emamectina).

A. linetaella: continua il secondo volo dell'anno. Monitorare la popolazione con le apposite trappole. La soglia indicativa per l'eventuale trattamento è di 7 catture/settimana o 10 in due settimane.

Forficula: continuano a verificarsi danni importanti specialmente sulle nettarine. Per il controllo delle popolazioni effettuare gli interventi nelle ore dopo il tramonto con spinosad o lambdacialotrina.

ALBICOCCO

Fase fenologica: accrescimento dei frutti, iniziata la raccolta delle varietà precoci.

Forficula: stesse considerazioni fatte per il pesco. Mantenere monitorata la presenza per posizionare eventuali trattamenti per il contenimento. Le sostanze attive utilizzabili sono lambda-cialotrina e spinosad.

SUSINO

Fase fenologica: accrescimento dei frutti.

Cydia funebrana: terminato il secondo volo dell'anno. In caso di necessità effettuare un intervento larvicida specifico.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

MELO

Fase fenologica: fase fenologica di accrescimento dei frutticini.

Glomerella: le alte temperature, unite alle piogge e all'elevata umidità, favoriscono le infezioni. Effettuare la difesa specifica, dando la preferenza a dithianon e captano. Anche il bicarbonato di potassio e o zolfo sono risultati in grado di limitare la malattia.

Cydia pomonella: continua il secondo volo della stagione. Continuare la difesa usando il virus della granulosi o altre sostanze larvicide (es. emamectina-benzoato, spinosad, acetamiprid).

Eulia: nel caso le trappole abbiano segnalato la presenza del fitofago, verificare la presenza delle larve e se necessario programmare un intervento specifico.

Scottature: con l'avanzare della stagione porre attenzione alle possibili scottature da sole. Curare l'irrigazione ed utilizzare prodotti schermanti.

PERO

Fase fenologica: accrescimento frutti.

Maculatura bruna: continuare la difesa sulle varietà sensibili con le sostanze attive indicate nel Disciplinare Produzione Integrata del Veneto.

Psilla: le condizioni climatiche del periodo favoriscono lo sviluppo del fitofago. Per il contenimento delle popolazioni sono efficaci i lavaggi mattutini per sciogliere la melata (e rendere vulnerabile l'insetto alle alte temperature) con bicarbonato di K e saponi molli potassici.

Cimice asiatica: presenza di adulti e qualche neanide appena nata. Si notano anche i primi danni in alcuni frutteti. Tenere monitorata la popolazione ed eventualmente intervenire con un insetticida. Al fine di salvaguardare il più possibile gli antocoridi, acetamiprid e piretroidi di sintesi vanno usati solo se strettamente necessario. Prima di intervenire monitorare e valutare la situazione.

Metcalfa pruinosa: segnalata la presenza, anche importante, in alcuni frutteti. I lavaggi effettuati per il contenimento della psilla hanno un'azione deprimente anche sulle popolazioni di metcalfa. Se necessario intervenire con acetamiprid o piretro naturale.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ACTINIDIA

Fase fenologica: accrescimento sia per *A. chinensis* che per *A. deliciosa*.

Cimice asiatica: ritrovamenti di ovature e neanidi di cimice di seconda età in aumento. Se necessario intervenire con etofenprox la mattina presto e bagnature appropriate.

Forficula: si notano numerose presenze di forficule nascoste tra i frutti. Al momento tale presenza non sembra essere causa di danni ai frutti.

Cimice asiatica: le popolazioni di adulti rimangono sostanzialmente su livelli bassi rispetto allo scorso anno. La scarsa presenza di giovani rilevata nelle trappole sembra indicare una elevata mortalità nel passaggio dalla generazione invernale a quella estiva. Continuare con il monitoraggio degli adulti negli appezzamenti, elemento base per decidere se effettuare il trattamento con abbattenti.

Aggiornamento cimice asiatica

- ❑ Nell'ultima settimana le catture di adulti sono pressoché stabili rispetto alla settimana scorsa.
- ❑ Le catture delle forme giovanili sono in leggero calo.
- ❑ Sono stati osservati i primi adulti della prima generazione annuale.
- ❑ Si osserva la presenza di ovature, di cui una buona parte è parassitizzata.

