

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 20 del 15/07/2026

Per i prossimi giorni sono ancora previste temperature sopra la media del periodo con possibili temporali.

PESCO

Fase fenologica: fine raccolta per Big top e Najirene. Inizio raccolta per Gea, Romagna Big e Alitop. Produzione alta produzione con pezzature medie, in generale.

Monilia: si ricorda l'importanza della protezione della coltura da effettuare con i due trattamenti preraccolta (-7,-3 gg), impiegando sostanze attive compatibili con il rispetto dei tempi di carenza. In questa fase possono trovare utilizzo anche gli agenti di biocontrollo e le sostanze attive di origine naturale.

Cydia molesta: la situazione in generale appare sotto controllo e non si lamentano danni particolari. Dove è stata superata la soglia delle 10 catture a settimana o in presenza di sintomi sui germogli effettuare un trattamento con prodotti larvicidi.

A. linetaella: terminato il secondo volo della stagione. L'eventuale trattamento si rende necessario solo se si è superata la soglia indicativa per l'intervento è di 7 catture/settimana o di 10 in due settimane.

Forficula: danni tendenzialmente in calo rispetto alle varietà più precoci, ma ancora significativi. Per il controllo delle popolazioni effettuare gli interventi nelle ore dopo il tramonto o nelle ore più fresche della giornata utilizzando spinosad o lamdacialotrina.

ALBICOCCO

Fase fenologica: accrescimento dei frutti, in raccolta varietà a maturazione tardiva come Swired, Faralia e Farbaly.

Forficula: stesse considerazioni fatte per il pesco. Mantenere monitorata la presenza per posizionare eventuali trattamenti per il contenimento.

A. linetaella: terminato il secondo volo della stagione. L'eventuale trattamento (es. *B.thuringiensis*, piretoridi) si rende necessario solo se si è superata la soglia indicativa per l'intervento è di 7 catture/settimana o di 10 in due settimane.

SUSINO

Fase fenologica: in raccolta varietà cino-giapponesi come Suplum 28 e Obilnaja.

Metcalfa pruinosa: in alcuni casi si nota la presenza di questo fitofago. S e necessario intervenire con sapone molle potassico.

Cydia funebrana: è terminato il secondo volo dell'anno e al momento non si segnalano problematiche significative. Tuttavia, se si sono avute catture significative sulle trappole, si può intervenire con sostanze attive ad azione larvicida.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

MELO

Fase fenologica: fase fenologica di accrescimento dei frutticini.

Glomerella: le alte temperature, unite alle piogge e all'elevata umidità, favoriscono le infezioni, già presenti su frutti in aziende a conduzione biologica. Effettuare la difesa specifica, dando la preferenza a dithianon e captano.

Cydia pomonella: terminato il secondo volo della stagione. Considerando l'elevato grado di attacco sui testimoni non trattati, l'aggressività del fitofago risulta particolarmente elevata. Continuare la difesa usando sostanze larvicide (es. virus della granulosi, emamectina-benzoato, spinosad).

Afide lanigero: l'aumento delle temperature ha favorito l'attività dell'*Aphelinus mali*. Pertanto si consiglia di evitare qualsiasi trattamento insetticida impattante che andrebbe a limitare l'attività del parassitoide. Eventualmente effettuare dei lavaggi con sapone molle potassico, utili per contenere le colonie, ma senza effetti negativi nei confronti di *A.mali*.

Metcalfa pruinosa: in alcuni frutteti la sua presenza si è fatta significativa. In caso di popolazioni elevate effettuare lavaggi con sapone molle potassico.

PERO

Fase fenologica: fine raccolta per Carmen, inizio per Santa Maria. Rallentamento generale della crescita dei frutti causata dalle alte temperature.

Maculatura bruna: non si riscontrano danni importanti. Continuare la difesa sulle varietà sensibili con le sostanze attive indicate nelle LTDI.

Psilla: in generale sotto controllo, presente in molti frutteti ma, al momento, le popolazioni non risultano particolarmente elevate. Per il loro contenimento sono efficaci i lavaggi mattutini per sciogliere la melata (e rendere vulnerabile l'insetto alla disidratazione) con bicarbonato di K e saponi molli potassici.

Cimice asiatica: presenza in genere ancora limitata. Tenere monitorata la popolazione per decidere un eventuale trattamento insetticida.

Metcalfa pruinosa: presenza elevata in alcuni impianti adulti e molto rigogliosi. Il sapone molle potassico è utile per evitare l'imbrattamento dei frutti e per deprimere la popolazione dell'insetto. Da evitare l'utilizzo dei piretroidi per gli effetti negativi nei confronti degli antocoridi, predatori della psilla.

ACTINIDIA

Fase fenologica: accrescimento sia per *A.chinensis* che per *A. deliciosa*.

Cimice asiatica: ritrovamenti di ovature e neanidi di cimice di seconda età in aumento. Se necessario intervenire con etofenprox la mattina presto e bagnature appropriate.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

Metcalfa pruinosa: in alcuni frutteti la sua presenza si è fatta significativa. In caso di popolazioni elevate effettuare lavaggi con sapone molle potassico.

Cimice asiatica: si osserva un costante aumento degli adulti della prima generazione annuale e la comparsa delle prime neanidi della seconda generazione. Si conferma anche una significativa riduzione delle popolazioni che si aggira attorno al 50% rispetto al 2025 ed un elevato numero di ovature parassitizzate. Con questi livelli di popolazione la necessità di trattamenti si riduce per cui è particolarmente importante il monitoraggio accurato per decidere l'eventuale trattamento insetticida.

Popilia japonica: come già segnalato nella nota precedente, la sua presenza comincia ad essere notata anche al di fuori dei focolai già noti. Si ricorda che è un organismo nocivo da quarantena e come tale sottoposto ad una stringente normativa. E' importante monitorare i frutteti e, in caso si noti del presenza del fitofago, segnalare il fatto al Servizio Fitosanitario utilizzando l'apposito form "Segnalazione Organismi Nocivi" <https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/dettaglio-news?articleId=14379883> . Al momento non sono necessari trattamenti insetticidi.

Mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*): l'anno scorso sono stati segnalati nel territorio regionale focolai di presenza della mosca. E' consigliato posizionare le apposite trappole per monitorare e verificare la presenza dell'insetto.