

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 21 del 23/07/2026

Per i prossimi giorni sono ancora previste temperature in calo, in linea con la media storica del periodo, con possibili temporali nel fine settimana.

PESCO

Fine raccolta per Big top e Najirene. Inizio raccolta per Gea, Romagna Big e Alitop. Produzione alta produzione con pezzature medie, in generale.

Monilia: qualche danno su frutti lesionati da forficula. Importante la protezione della coltura da effettuare con i due trattamenti preraccolta, impiegando sostanze attive compatibili con il rispetto dei tempi di carenza. In questa fase possono trovare utilizzo anche gli agenti di biocontrollo e le sostanze attive di origine naturale.

Cydia molesta: la situazione in generale appare sotto controllo e non si lamentano danni particolari, anche se nell'ultimo periodo le catture nelle trappole sono state particolarmente significative. Dove è stata superata la soglia delle 10 catture a settimana o in presenza di sintomi sui germogli effettuare un trattamento con prodotti larvicidi.

A. linetaella: terminato il secondo volo della stagione. Al momento non sono necessari interventi specifici

Tripide estivo: si segnalano danni su nettarine da parte di questo tisanottero, anche di una certa entità. Fenomeno da considerare per la prossima stagione quando andrà impostata una strategia di difesa adeguata.

Forficula: danni ancora significativi. Per il controllo delle popolazioni effettuare gli interventi nelle ore dopo il tramonto o nelle ore più fresche della giornata utilizzando spinosad o lamdacialotrina.

ALBICOCCO

Fase fenologica: in raccolta varietà a maturazione tardiva

Forficula: stesse considerazioni fatte per il pesco. Mantenere monitorata la presenza per posizionare eventuali trattamenti per il contenimento.

SUSINO

Fase fenologica: in raccolta varietà cino-giapponesi

Metcalfa pruinosa: in alcuni casi si nota la presenza di questo fitofago. Se necessario intervenire con sapone molle potassico.

Cydia funebrana: è terminato il secondo volo dell'anno e al momento non si segnalano problematiche significative. Tuttavia, se si sono avute catture significative sulle trappole, si può intervenire con sostanze attive ad azione larvicida.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

MELO

Fase fenologica: prossima la raccolta dei cloni precoci di Gala

GLS/BR: le piogge del periodo favoriscono le infezioni, già presenti su frutti in aziende a conduzione biologica. Le prossime settimane rappresentano il periodo più critico per questo patogeno. Continuare con la difesa specifica utilizzando le sostanze attive indicate nelle LTDI.

Cydia pomonella: terminato il secondo volo della stagione. Dove si riscontra la presenza di frutti bacati o catture significative, continuare la difesa usando sostanze ad azione larvicida.

Afide lanigero: l'aumento delle temperature ha favorito l'attività dell'*Aphelinus mali*.

Eventualmente effettuare dei lavaggi con sapone molle potassico, utili per contenere le colonie.

PERO

Fase fenologica: in raccolta la varietà Santa Maria.

Maculatura bruna: qualche frutto colpito comincia ad essere osservato sulle varietà sensibili. Continuare la difesa con le sostanze attive indicate nelle LTDI.

Psilla: in generale sotto controllo, anche per l'azione deprimente delle piogge sul loro sviluppo. Per il loro contenimento sono efficaci i lavaggi mattutini per sciogliere la melata (e rendere vulnerabile l'insetto alla disidratazione) con bicarbonato di K e saponi molli potassici.

Cimice asiatica: presenza in genere ancora limitata, anche se in aumento. Tenere monitorata la popolazione per decidere un eventuale trattamento insetticida.

Metcalfa pruinosa: presenza elevata in alcuni impianti adulti e molto rigogliosi. Il sapone molle potassico è utile per evitare l'imbrattamento dei frutti e per deprimere la popolazione dell'insetto. Da evitare l'utilizzo dei piretroidi per gli effetti negativi nei confronti degli antocoridi, predatori della psilla.

ACTINIDIA

Fase fenologica: accrescimento sia per *A.chinensis* che per *A. deliciosa*.

Cimice asiatica: ritrovamenti di ovature e neanidi di cimice di seconda età in aumento. Se necessario intervenire con etofenprox la mattina presto e bagnature appropriate.

Metcalfa pruinosa: in alcuni frutteti la sua presenza si è fatta significativa. In caso di popolazioni elevate effettuare lavaggi con sapone molle potassico.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

Cimice asiatica: si conferma anche una significativa riduzione degli individui catturati nelle trappole che si aggira attorno al 50% rispetto al 2025. E' invece in aumento la presenza di individui all'interno dei frutteti, fenomeno favorito dalla maggiore attrattività delle colture in maturazione. In ogni caso i danni sono ancora limitati. Importante il monitoraggio accurato dei frutteti per decidere l'eventuale trattamento insetticida.

Popilia japonica: ormai siamo prossimi alla fine del volo degli adulti. E' sempre importante monitorare i frutteti e, in caso si noti del presenza del fitofago, segnalare il fatto al Servizio Fitosanitario utilizzando l'apposito form "Segnalazione Organismi Nocivi" <https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/dettaglio-news?articleId=14379883>. Per i livelli di presenza segnalati fino ad ora non sono necessari trattamenti insetticidi.

Mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*): segnalati nel territorio regionale focolai di presenza della mosca. E' consigliato posizionare le apposite trappole per monitorare e verificare la presenza dell'insetto.