

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 22 del 29/07/2026

Per i prossimi giorni sono ancora previste temperature in forte aumento e assenza di piogge.

PESCO

Fase fenologica: inizio raccolta della varietà Orion

Monilia: qualche danno su frutti lesionati da forficula. Importante la protezione della coltura da effettuare con i due trattamenti preraccolta, impiegando sostanze attive compatibili con il rispetto dei tempi di carenza. In questa fase possono trovare utilizzo anche gli agenti di biocontrollo e le sostanze attive di origine naturale.

Cydia molesta: non si segnalano danni particolari. In generale le catture ancora sotto soglia: dove essa è stata superata (10 catture a settimana) o in presenza di sintomi sui germogli effettuare un trattamento con prodotti larvicidi (es.: spinosad, emamectina).

A. linetaella: iniziato il terzo volo della stagione. Al momento non sono necessari interventi specifici

Forficula: danni ancora significativi. Per il controllo delle popolazioni effettuare gli interventi nelle ore dopo il tramonto o nelle ore più fresche della giornata utilizzando spinosad o lambda-cialotrina.

Cimice asiatica: segnalati danni da cimice asiatica, in aumento, sui frutti in maturazione. In caso di necessità intervenire con etofenprox (utile anche contro *C. molesta*).

MELO

Fase fenologica: inizia la raccolta dei cloni precoci di Gala.

GLS/BR: le piogge e le temperature del periodo sono molto favorevoli alle infezioni. Per ora non si riscontrano sintomi su foglia e/o defogliazione imputabile ad essa. Danni rilevanti sono invece presenti in meleti a conduzione biologica. Continuare la difesa specifica contro GLS, con fluazinam, dithianon, captano, mix zolfo/bicarbonato.

Cydia pomonella: è iniziato il terzo volo. Presenza di danni in meleti biologici in cui non si fa la confusione sessuale. Monitorare il volo ed in caso di catture importanti e/o di frutti bacati procedere con la difesa con sostanze larvicide (es.: virus della granulosa, emamectina, spinosad).

Afide lanigero: l'aumento delle temperature ha favorito l'attività dell'*Aphelinus mali* con conseguente buon contenimento delle colonie.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

PERO

Fase fenologica: in raccolta la William.

Maculatura bruna: dopo le piogge delle ultime settimane in aumento il rischio di infezioni. Le sostanze attive da utilizzare per una difesa efficace sono quelle indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata Regionale.

Psilla: in aumento la presenza del fitofago e la produzione di melata. Per la difesa sono efficaci lavaggi mattutini con alti volumi di acqua impiegando sapone molle e Bicarbonato di K.

Cimice asiatica: importante aumento di danni da cimice asiatica su Santa Maria in maturazione. Dai primi stacchi di William si nota un superiore alle aspettative, in particolare in frutteti rigogliosi, su frutti raggruppati.

Metcalfa pruinosa: sempre alta e addirittura in aumento la presenza di metcalfa, soprattutto in frutteti rigogliosi. Per il contenimento utili i lavaggi mattutini con sapone molle potassico.

ACTINIDIA

Fase fenologica: accrescimento sia per *A. chinensis* che per *A. deliciosa*.

Moria: piante sintomatiche in forte aumento in diverse zone. Com'è noto, non esiste attualmente nessuna cura per arginare la problematica, se non l'impiego di portinnesti tolleranti nei nuovi impianti. È comunque importante porre l'adeguata attenzione alla fertilità e al microbioma del terreno.

Cimice asiatica: si conferma ancora una significativa riduzione degli individui catturati nelle trappole rispetto al 2025. È invece in aumento la presenza di individui all'interno dei frutteti, fenomeno favorito dalla maggiore attrattività delle colture in maturazione, con presenza di danni su pesco e pero. Importante il monitoraggio accurato dei frutteti per decidere l'eventuale trattamento insetticida.

Aggiornamento cimice asiatica

- ☐ Nell'ultima settimana i rilievi di adulti e giovani catturati sono in leggero aumento rispetto alla settimana precedente.
- ☐ Si osservano forme mobili a tutti gli stadi compresi gli adulti della prima generazione annuale.
- ☐ Si osserva la presenza di ovature fresche



BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

POPILLIA JAPONICA: ormai siamo prossimi alla fine del volo degli adulti. È importante monitorare i frutteti e, in caso si noti la presenza del fitofago, segnalarlo tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale, utilizzando l'apposita applicazione "*Segnalazione Organismi Nocivi*":

- <https://mebtel.regione.veneto.it/fitosanitario/public/moduli-pubblici>

La segnalazione avviene tramite la compilazione di un breve form e caricando una o più foto dell'organismo nocivo.

Per i livelli di presenza segnalati fino ad ora non sono necessari trattamenti insetticidi. Per approfondimenti:

<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/popillia-japonica>

Mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*): l'anno scorso sono stati segnalati nel territorio regionale focolai di presenza della mosca. È opportuno posizionare le trappole per monitorare e verificare la presenza dell'insetto.