

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 23 del 19/08/2026

Per i prossimi giorni sono ancora previste temperature in calo e aumento dei fenomeni temporaleschi.

PESCO

Fase fenologica: in raccolta varietà di nettarine come Dulciva e Dulcior

Monilia: importante la protezione della coltura da effettuare con i due trattamenti preraccolta, impiegando sostanze attive compatibili con il rispetto dei tempi di carenza. In questa fase possono trovare utilizzo anche gli agenti di biocontrollo e le sostanze attive di origine naturale.

Cydia molesta: non si segnalano danni particolari. Dove è stata superata la soglia di intervento (10 catture a settimana) o in presenza di sintomi sui germogli, effettuare un trattamento con prodotti larvicidi (es.: spinosad, emamectina).

Forficula: si conferma la causa più importante di danno ai frutti.

Per il controllo delle popolazioni effettuare gli interventi nelle ore dopo il tramonto o nelle ore più fresche della giornata utilizzando spinosad o lambdacialotrina.

SUSINO

Fase fenologica: inizio raccolta per le varietà europee come Stanley e Grossa di Felisio. Buona la produzione e la pezzatura in generale, meno la colorazione.

Cocciniglia: presenza sporadica. In caso di necessità si potrebbe ancora intervenire, facendo molta attenzione al rispetto dei tempi di carenza, con pyriproxifen.

MELO

Fase fenologica: gruppo Gala in fase di fine raccolta.

GLS/BR: le prossime piogge saranno molto favorevoli alle infezioni. Per ora i sintomi su foglia e/o defogliazione imputabile ad essa sono molto limitati. Danni rilevanti sono invece presenti su frutto in meleti a conduzione biologica. Continuare la difesa specifica contro GLS, con captano, eventualmente anche dopo la raccolta.

Cydia pomonella: terzo volo quasi terminato. Presenza di danni in meleti biologici BIO, in cui non si fa la confusione sessuale. In caso di catture importanti e/o di frutti bacati continuare con la difesa con sostanze larvicide (es.: virus della granulosi, emamectina, spinosad).

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

PERO

Fase fenologica: in raccolta la varietà Conference e, tra qualche giorno, Abate

Maculatura bruna: sintomi generalmente ancora limitati. In caso di necessità effettuare un ultimo trattamento con le sostanze attive indicate nel Disciplinare di Produzione integrata regionale, compatibilmente con i tempi di carenza.

Psilla: presenza del fitofago limitata. Per la difesa sono efficaci lavaggi mattutini con alti volumi di acqua impiegando sapone molle e Bicarbonato di K.

Cimice asiatica: qualche danno nella parte alta della chioma, ma in misura minore rispetto alla scorsa stagione.

ACTINIDIA

Fase fenologica: accrescimento sia per *A. chinensis* che per *A. deliciosa*.

Moria: piante sintomatiche in forte aumento in diverse zone. Com'è noto, non esiste attualmente nessuna cura per arginare la problematica, se non l'impiego di portinnesti tolleranti nei nuovi impianti. È comunque importante porre l'adeguata attenzione alla fertilità e al microbioma del terreno.

Cimice asiatica: le popolazioni sono generalmente in calo, soprattutto relativamente agli stadi adulti. In aumento la presenza delle forme giovanili. Si conferma la riduzione generale della popolazione rispetto alle annate precedenti. Siamo in corrispondenza del periodo in cui le colture frutticole, molte già in corso di raccolta (pesco, pero, melo), sono molto attrattive per la cimice a causa dei composti volatili della frutta, che competono molto con le trappole a cattura massale. Il monitoraggio accurato dei propri appezzamenti è necessario per identificare la necessità di trattamenti.

Mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*): segnalata la presenza di alcuni piccoli focolai. Monitorare la situazione nel proprio frutteto, attraverso le apposite trappole. Ciò consente di intervenire in modo tempestivo ed efficace in caso di presenza dell'insetto.