

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 24 del 26/08/2026

Per i prossimi giorni sono previste temperature in aumento e assenza di fenomeni temporaleschi.

PESCO

Fase fenologica: terminata la raccolta

Batteriosi: programmare una profilassi attenta, da iniziare in settembre, basata su trattamenti quindicinali, con prodotti rameici a basso dosaggio.

SUSINO

Fase fenologica: inizio raccolta per le varietà europee come Stanley e Grossa di Felisio. Buona la produzione e la pezzatura in generale, meno la colorazione.

Cocciniglia: presenza sporadica. In caso di necessità si potrebbe ancora intervenire, facendo molta attenzione al rispetto dei tempi di carenza, con pyriproxifen.

MELO

Fase fenologica: terminata la raccolta delle varietà del gruppo Gala

GLS/BR: al momento i sintomi in campo sono molto limitati. Danni rilevanti sono stati invece segnalati su frutto in alcuni meleti a conduzione biologica. Le piogge della settimana scorsa hanno creato le condizioni ideali per le infezioni che quindi si prevedono in aumento. Continuare la difesa specifica, valutando anche la necessità di effettuare alcuni interventi dopo la raccolta per evitare la defogliazione della coltura.

Cydia pomonella: terzo volo terminato. Presenza di danni in aumento anche nei frutteti a gestione integrata. L'aggressività del fitofago appare, quest'anno, particolarmente elevata. Prestare attenzione alla situazione del proprio frutteto e continuare la difesa con prodotti ad azione larvicida (es.: virus della granulosi, emamectina, spinosad).

Malattie post raccolta: programmare una difesa adeguata, con trattamenti pre-raccolta per le varietà medio tardive e tardive, utilizzando le sostanze attive indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata del Veneto.

Piralide: monitorare attentamente i frutteti, soprattutto dove storicamente la popolazione dell'insetto è più elevata e/o vicino ai campi di mais trinciato. Rilevata la presenza intervenire con B.t. (l'eventuale intervento contro carpocapsa con un larvicida è attivo anche contro questo lepidottero).

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

PERO

Fase fenologica: terminata la raccolta della varietà Conference, a breve inizierà quella di Abate.

Maculatura bruna: sintomi generalmente molto limitati. In caso di necessità effettuare un ultimo trattamento con le sostanze attive indicate nel Disciplinare regionale, compatibilmente con i tempi di carenza.

Cimice asiatica: qualche danno nella parte alta della chioma, ma in misura minore rispetto alla scorsa stagione.

ACTINIDIA

Fase fenologica: ripresa dell'accrescimento sia per *A.chinensis* che per *A. deliciosa*.

Moria: in costante diffusione. Non esiste nessuna cura per arginare la problematica, se non l'impiego di portinnesti tolleranti nei nuovi impianti. Nel caso in cui la sindrome sia ormai insediata nel frutteto, valutare la convenienza economica al suo mantenimento.

Cimice asiatica: continua il calo delle popolazioni soprattutto relativamente agli stadi adulti. In aumento la presenza delle forme giovanili della seconda generazione. Si conferma la riduzione generale della popolazione rispetto alle annate precedenti. Continuare con il monitoraggio dei frutteti, indispensabile per valutare la necessità di trattare o meno.

Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*): fitofago in espansione, monitorare la situazione nel proprio frutteto, attraverso le apposite trappole.