

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 25 del 03/09/2026

Per i prossimi giorni sono previste ancora temperature in aumento e assenza di fenomeni temporaleschi.

PESCO

Fase fenologica: terminata la raccolta

Batteriosi: con le prime piogge attuare una profilassi attenta, basata su trattamenti quindicinali con prodotti rameici a basso dosaggio.

ALBICOCCO

In assenza di piogge è consigliabile eseguire un intervento di potatura verde, eliminando le branche medio-grosse ed i rami assurgenti sia interni che esterni. Intervenendo in questo periodo si limita il rischio di attacchi da batteriosi con una limitata risposta vegetativa della pianta. Appena terminata la potatura, effettuare un primo intervento con prodotti rameici

MELO

Fase fenologica: prossima la raccolta della Golden

GLS/BR: al momento i sintomi in campo sono ancora limitati. Danni rilevanti sono segnalati su frutto solo alcuni meleti a conduzione biologica. Nel mese di agosto il modello ha segnalato un paio di eventi infettivi, i cui sintomi dovrebbero comparire nei prossimi giorni. Continuare la difesa specifica, valutando anche la necessità di effettuare alcuni interventi dopo la raccolta per evitare la defogliazione della coltura.

Cydia pomonella: terzo volo terminato. Si segnala la presenza di danni in aumento anche nei frutteti a gestione integrata. L'aggressività del fitofago appare, quest'anno, particolarmente elevata. Prestare attenzione alla situazione del proprio frutteto e continuare la difesa con prodotti ad azione larvicida (es.: virus della granulosi, emamectina, spinosad).

Malattie post raccolta: programmare una difesa adeguata, con trattamenti pre-raccolta per le varietà medio tardive e tardive, utilizzando le sostanze attive indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale.

Piralide: monitorare attentamente i frutteti, soprattutto dove storicamente la popolazione dell'insetto è più elevata e/o vicino ai campi di mais trinciato. Rilevata la presenza intervenire con B.t. (l'eventuale intervento contro carpocapsa con un larvicida è attivo anche contro questo lepidottero).

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

PERO

Fase fenologica: iniziata la raccolta della varietà Abate

Maculatura bruna: sintomi generalmente molto limitati.

Cimice asiatica: qualche danno nella parte alta della chioma, ma in misura minore rispetto alla scorsa stagione.

ACTINIDIA

Fase fenologica: ripresa dell'accrescimento sia per *A. chinensis* che per *A. deliciosa*.

Cimice asiatica: monitorare con attenzione il frutteto per individuare l'eventuale presenza del fitofago. In caso di necessità necessario con le sostanze attive indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale.

Eulia: verificare con attenzione l'eventuale presenza di larve sulla vegetazione e sui frutti. In caso di riscontro positivo intervenire con *Bacillus thuringiensis*, attenendosi alle modalità di impiego previste dall'etichetta del formulato autorizzato.

Cimice asiatica: sulle trappole si nota una ripresa degli adulti, con quantità che sono comunque inferiori rispetto alla scorsa annata. Il monitoraggio accurato dei frutteti è sempre necessario per identificare la necessità di trattamenti.

Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*): fitofago in espansione, monitorare la situazione nel proprio frutteto, attraverso le apposite trappole.