

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 26 del 09/09/2026

Per i prossimi giorni sono previste temperature in calo e piovosità diffusa.

PESCO

Fase fenologica: terminata la raccolta

Batteriosi: programmare una profilassi attenta, basata su trattamenti quindicinali con prodotti rameici a basso dosaggio.

SUSINO

Terminata la raccolta delle susine europee. In raccolta le varietà cino-giapponesi.

Monilia: qualche sintomo sulle varietà cino-giapponesi. In caso di necessità intervenire con trattamenti specifici, con i prodotti previsti nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale e nel rispetto dei tempi di carenza.

MELO

Fase fenologica: inizio raccolta delle varietà Granny e Golden

GLS/BR: al momento i sintomi in campo sono molto limitati, danni rilevanti sono stati invece segnalati su frutto in alcuni meleti a conduzione biologica. Negli ultimi dieci giorni sono comparsi sintomi importanti nei testimoni non trattati.

Le piogge di questo periodo sono condizioni ideali per le infezioni. Continuare la difesa specifica, valutando, nella scelta delle sostanze attive, i tempi di carenza dei diversi prodotti.

Malattie post raccolta: programmare una difesa adeguata, con trattamenti pre-raccolta per le varietà medio tardive e tardive, utilizzando le sostanze attive indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale.

Piralide: monitorare attentamente i frutteti, soprattutto dove storicamente la popolazione dell'insetto è più elevata e/o vicino ai campi di mais trinciato. Rilevata la presenza intervenire con B.t. (l'eventuale intervento contro carpocapsa con un larvicida è attivo anche contro questo lepidottero).

Afide lanigero: presenza di colonie attive in aumento, specialmente nei frutteti rigogliosi di varietà come Granny Smith. Questo aspetto sottolinea come la corretta gestione della chioma sia un elemento fondamentale nella gestione delle popolazioni dell'afide.

Cemistoma: segnalata presenza di sintomi (mine) in alcuni frutteti.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

PERO

Fase fenologica: ultimi giorni di raccolta per la varietà Abate Fetel. In piena raccolta le varietà Kaiser e Fred.

Maculatura bruna: sintomi generalmente molto limitati, anche se in aumento.

Cimice asiatica: danni limitati, nella parte alta della chioma.

C.pomonella, C. molesta: qualche danno su frutto è comparso negli ultimi 10 giorni, in alcuni frutteti.

ACTINIDIA

Fase fenologica: ripresa dell'accrescimento sia per *A. chinensis* che per *A. deliciosa*.

Cascola: preoccupante cascola di frutti con disseccamenti dei peduncoli in diversi impianti di *Actinidia chinensis*. Le cause sono diverse e di natura abiotica: gestione idrica non ben controllata, stress continui da calore per diversi mesi, sbilanciamento nutrizionale tra Calcio, Magnesio, Potassio.

NOCE

Fase fenologica: BBCH 85-86 - maturazione del frutto. Raccolta prevista dalla seconda metà di settembre.

Carpocapsa: il secondo volo di carpocapsa in base alle catture risulta terminato.

Mosca (*Rhagoletis completa*): presente ancora qualche sporadica cattura. Segnalati danni in alcune aziende.

***Ectomyelois ceratoniae*:** al momento non si è riscontrata la presenza.



Danni da larva di mosca
(Alessio Signori)

Cimice asiatica: continua il calo delle catture degli individui di cimice asiatica. Si conferma anche la riduzione generale della popolazione rispetto alle annate precedenti. Continuare con il monitoraggio dei frutteti, indispensabile per valutare la necessità di trattare o meno.

Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*): si segnala la presenza del fitofago in alcuni frutteti. Continuare il monitoraggio nel frutteto attraverso le apposite trappole.