

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE FRUTTICOLE

Bollettino n. 28 del 23/09/2026

Le previsioni meteo indicano un abbassamento delle temperature cui seguirà un rialzo delle stesse e l'assenza di piogge per tutta la settimana.

PESCO

Batteriosi, cancri rameali: prevedere un paio trattamenti a distanza di 10-15 giorni, con prodotti rameici a basso dosaggio.

Bolla, corineo: da caduta foglie in poi prevedere uno, due trattamenti con captano.

MELO

Fase fenologica: in raccolta la varietà Granny, quasi terminata quelle del gruppo Golden.

GLS/BR: aumenta la presenza di sintomi su frutti. Continuare la difesa specifica, valutando, nella scelta delle sostanze attive, i tempi di carenza dei diversi prodotti.

Malattie post raccolta: per le varietà ancora da raccogliere si consiglia di mantenere una protezione adeguata dei frutti valutando con attenzione il dilavamento dei prodotti distribuito in precedenza. Si ricorda di porre attenzione all'intervallo di sicurezza dei prodotti impiegabili.

Afide lanigero: si segnala un generale aumento della presenza del fitomizo, soprattutto in frutteti con vegetazione molto sviluppata.

Cancro rameali: prevedere ad inizio caduta foglie un paio trattamenti a distanza di 10-15 giorni, con prodotti rameici.

Carpocapsa: dove si sono avute infestazioni importanti è utile, per abbassare la popolazione larvale svernante, trattare nelle prossime settimane con nematodi entomopatogeni avendo cura di effettuare l'applicazione in giornate piovose o molto umide.

PERO

Fase fenologica: terminata la raccolta.

Cancro rameali: prevedere ad inizio caduta foglie un paio trattamenti a distanza di 10-15 giorni, con prodotti rameici.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ACTINIDIA


Fase fenologica: accrescimento per *A. chinensis*, prossimo inizio della raccolta per *A. deliciosa*.

Kiwi «giallo»: continua la forte cascola di frutti, in tutti i territori di produzione, derivante dal disseccamento del peduncolo del frutto. È possibile che causa di questo fenomeno sia da imputare sicuramente agli stress termici che le piante di Kiwi hanno dovuto sopportare per più di due mesi.

Non è da escludere del tutto l'azione di qualche agente patogeno, per individuare il quale sono in corso indagini di laboratorio.

Cimice asiatica: generale aumento delle popolazioni di cimice asiatica di diverse età. Monitorare con attenzione ed intervenire su Hayward, in casi particolari, con Etofenprox

Cimice asiatica: le popolazioni di cimice registrano un aumento dei giovani e degli adulti di seconda generazione, individui destinati a passare l'inverno. In questa fase diventa molto attrattivo il kiwi, nel quale occorre continuare con il monitoraggio, necessario per valutare la necessità dei trattamenti. In generale si conferma sul territorio una minore incidenza dei danni su pero rispetto al 2025.



Mosca della frutta (*Ceratitis capitata*): si segnala la presenza del fitofago in alcuni frutteti. Continuare il monitoraggio nel frutteto attraverso le apposite trappole.

Bactrocera dorsalis: segnalata la presenza in Veneto (comune di Venezia) di questo organismo nocivo da quarantena prioritario. Per approfondimenti [vedi la news dedicata](#) e la [pagina web dedicata](#).