

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE ORTICOLE

Bollettino n. 02 del 13/03/2026

POMODORO, ZUCCHINO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO IN SERRA

Siamo prossimi ai trapianti in serra, di pomodoro, zucchini, melanzana, peperone, cetriolo e prima di effettuare questa operazione si consiglia di:

- controllare che le coperture delle serre siano in condizioni ottimali ed eventualmente sostituirle (rotte o troppo vecchie con poca luminosità oppure oltre il periodo massimo di durata);
- verificare che le reti antinsetto siano sane, non rotte o con presenza di buchi. Per il controllo della *Tuta absoluta* su pomodoro installare reti con un foro di 1x1 mm (ottimale 0,8x0,8 mm), sia nelle aperture laterali che in quelle al colmo per ridurre al minimo una possibile entrata dall'esterno dell'insetto;
- pulire dall'erba lungo le file dei pali della serra e lungo i bordi;
- verificare che gli impianti di irrigazione siano efficienti e puliti (pulire gli ugelli aerei ed eventualmente sostituire le manichette);
- sistemare il terreno in modo da garantire un ottimo deflusso delle acque in eccesso e ridurre al minimo la penetrazione dell'acqua dall'esterno eventualmente sostituire i battiscopa dei laterali;
- preparare il terreno in modo adeguato alla messa a dimora delle piantine;
- effettuare delle concimazioni organiche prima del trapianto;
- dove le condizioni sanitarie del terreno sono abbastanza precarie (presenza di sclerotinia, fusarium) prima del trapianto utilizzare i funghi antagonisti presenti Linee di difesa integrata della regione Veneto per gestire al meglio queste malattie, (<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata>);
- non anticipare troppo il trapianto di alcune specie come il peperone e il cetriolo se non sono presenti eventuali sistemi di soccorso per le possibili gelate tardive;
- effettuare dopo il trapianto delle irrigazioni localizzate in modo da garantire un buon attecchimento della pianta;
- controllare che le piantine all'arrivo siano sane, esenti da parassiti;
- installare trappole cromotropiche gialle per il rilievo su pomodoro della mosca bianca e trappole cromotropiche azzurre per il rilievo dei tripidi su melanzana e peperone.

CAVOLFIORI, CAVOLO CAPPUCCIO

A pieno campo iniziati i trapianti per queste crucifere. In questa fase le piantine vanno opportunamente protette con tessuto non tessuto per evitare stress da freddo responsabile di diverse fisiopatie (bottonatura, accecamento, ecc.). Monitorare eventuali danni da mosca (*Delia platura*).