SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO

U.O. Fitosanitario

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE ORTICOLE

Bollettino n. 09 del 28/05/2026

LATTUGA

In alcuni appezzamenti di lattuga si nota la presenza di tripide specialmente nelle foglie più esterne, che si caratterizza da lesioni necrotiche puntiformi vicino ai margini fogliari le quali compromettono la conservabilità del prodotto e diminuiscono il valore commerciale. Con reale presenza intervenire con i principi attivi indicati nel Disciplinare Produzione Integrata della Regione Veneto (https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata).

ZUCCHINO

In questo periodo si riscontra una scarsa produzione di zucchino, con frutti corti e scuri o giallastri. Non si tratta di problemi sanitari della pianta, ma le cause sono imputabili alle condizioni climatiche di caldo e freddo dell'ultimo periodo, che non consentono uno sviluppo omogeneo della pianta e portano ad un invecchiamento precoce del frutto. Quando le condizioni atmosferiche si riequilibreranno questo fenomeno si risolverà. Per il momento eliminare i frutti molto scuri o giallastri e parte dei fiori, per irrobustire la pianta.

BATATA

Prosegue il trapianto delle talee di Batata. Si raccomanda la posa sopra una baula lavorata a grana fine, su terreno in tempera, non concimati direttamente con letame o liquami per evitare lo sviluppo di funghi patogeni (in particolare del *Monilochaetes infuscans*) che possono infettare le batate durante il loro sviluppo.

CICORIA

Prestare attenzione a possibili focolai di afide presenti nella parte bassa e verso l'interno delle foglie. Con reale presenza intervenire con i principi attivi indicati nel Disciplinare Produzione Integrata della Regione Veneto (https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata).

ASPARAGO IN PRODUZIONE

La raccolta dell'asparago è ultimata e pertanto si consiglia di effettuare la spianatura dei cumuli o la totale raccolta dei turioni, effettuare una concimazione organica a spaglio,un eventuale apporto di fosforo e potassio e una prima frazione di azoto. Successivamente intervenire con una estirpatura o fresatura nell'interfila e successivo diserbo di post raccolta.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

PATATA

Lo stadio vegetativo varia dai primi fiori (varietà e semine più tardive) a fine fioritura (varietà e semine precoci)
Peronospora sotto controllo con trattamenti preventivi e condizioni sfavorevoli allo sviluppo, mentre alcune infezioni presenti su appezzamenti con ristagni idrici e vegetazione molto vigorosa che non ha permesso una veloce asciugatura dopo le piogge.
Alternaria: presenza di sporadiche infezioni emerse a seguito di forti escursioni termiche della scorsa settimana; alcuni produttori già intervenuti con difenoconazolo.
Per la Dorifora presenza generalizzata con bassa pressione su semine e varietà tardive, mentre risulta in aumento su appezzamenti ancora non trattati con insetticidi.
Tignola presente: installare quanto prima trappole a feromoni per un monitoraggio in campo e per un supporto decisionale per gli interventi insetticidi.

POMODORO DA INDUSTRIA (BASSO E MEDIO VERONESE)

Condizioni meteo, varietà coltivate e pratiche agronomiche locali possono influenzare l'evoluzione delle problematiche.
Peronospora: al momento non si riscontrano infezioni. In caso di pioggia e umidità elevata, intervenire preventivamente con idonei prodotti.
Batteriosi: presenza in alcuni impianti. Si consigliano interventi a base di rame in addizione con veicolanti chelati per una migliore disinfezione.
Afidi: presente 2-3 individui per pianta. Proseguire il monitoraggio settimanale e se la densità della popolazione > 3-5 ind./pianta, valutare interventi mirati compatibili con la flora locale.
Heliotis armigera: presenza di adulti. Proseguire il monitoraggio settimanale per valutare un intervento con ovo-larvicida.

ORTICOLE IN SERRA

Attenzione particolare, visto le alte temperature registrate in questi ultimi giorni. Si consiglia di procedere con l'applicazione di ombreggianti specifici per serre specialmente per le colture più sensibili come peperone, fragola e pomodoro.

FRAGOLA

Come riportato nella precedente nota, ottimo il controllo di acari e tripidi da parte degli insetti utili lanciati precedentemente, mentre ancora presenti infezioni di oidio specialmente a carico dei frutti. In tal caso intervenire con prodotti specifici come indicato nel Disciplinare Produzione Integrata della Regione Veneto.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

MELANZANA

Prestare attenzione a possibili attacchi di afidi. Con presenza, intervenire sui focolai, mentre, se l'infestazione interessa tutta la superficie, utilizzare prodotti selettivi per poi effettuare un eventuale lancio di ausiliari.
Attenzione anche all'eventuale presenza del miride *(Lygus rugulipennis),* rilevato in diversi impianti e visto il notevole rischio di danno a carico dei piccoli fiori, ove necessario, intervenire con prodotti specifici come indicato Nel Disciplinare Produzione Integrata della Regione Veneto.
Presenza sporadica di altica ed i primi focolai di ragnetto rosso; quest'ultimo particolarmente pericoloso visto il periodo caldo del momento. Procedere con eventuali lanci di predatori specifici contro questi acari.

PEPERONE

Su diversi impianti si iniziano a vedere i primi attacchi dei principali fitofagi come afidi e tripidi. Dove le piante hanno raggiunto un buon sviluppo vegetativo al punto di essere tra loro in contatto si consiglia di procedere con il lancio di predatori specifici.