

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE ORTICOLE

Bollettino n. 18 del 31/07/2026

ORTICOLE IN PIENO CAMPO

POMODORO DA INDUSTRIA

Le osservazioni in campo effettuate nella settimana dal 20 al 26 luglio confermano che il recente quadro meteorologico (piogge e calo delle temperature) hanno creato un ambiente ideale per la diffusione e lo sviluppo dei patogeni. Il previsto aumento delle temperature inibirà l'insorgenza di nuovi focolai infettivi.

Peronospora: Non si registrano infezioni attive. Si raccomanda di proseguire con un costante monitoraggio in campo.

Alternaria: il calo termico e le frequenti precipitazioni registrate nella settimana 20-26 luglio hanno agevolato l'insorgenza delle infezioni, con comparsa dei primi sintomi sulla vegetazione. Si consiglia di intervenire con difenoconazolo in miscela con un prodotto di copertura come il Rame.

Cimice verde: si nota la presenza di punture di nutrizione sulle bacche, provocate dalle neanidi. In questi casi intervenire con un trattamento con etofenprox.

CAVOLO (A TESTA, FOGLIA E INFIORESCENZA)

Altica: si segnala la presenza del coleottero. Se necessario intervenire nelle prime ore della mattina quando gli adulti sono poco mobili. Dopo alcuni giorni dal trattamento controllare l'efficacia del prodotto.

Per queste tipologie di colture si consiglia di mantenere il terreno umido e se necessario effettuare delle sarchiature in modo da garantire un terreno soffice e con una buona riserva idrica.

Mantenere la pianta turgida attraverso la somministrazione di concimazioni organiche per via fogliare. In questo periodo limitare le concimazioni localizzate con azoto ai soli casi di effettiva necessità.

LATTUGA PIENO CAMPO

Tripide: in alcuni appezzamenti di lattuga si nota la presenza del fitofago, specialmente nelle foglie più esterne, che si caratterizza da lesioni necrotiche puntiformi vicino ai margini fogliari le quali compromettono la conservabilità del prodotto e diminuiscono il valore commerciale.

Piralide: prestare attenzione alla presenza di larve nella parte basale delle foglie. In caso affermativo intervenire con le s.a. indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata del Veneto (<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata>).

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO

U.O. Fitosanitario

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ORTICOLE IN SERRA

POMODORO

Tuta absoluta: rilevata la presenza di larve nelle foglie specialmente su nuovi impianti. Asportare il più possibile le foglie colpite e successivamente intervenire con le s.a. indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata (<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata>), rispettando il dosaggio di etichetta contro questo insetto e aggiungere un olio vegetale se la compatibilità dell'insetticida lo permette.