

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE ORTICOLE

Bollettino n. 19 del 05/08/2026

ORTICOLE IN PIENO CAMPO

RADICCHIO (VARIEGATO, LUNGO PRECOCE, TARDIVO)

Nei trapianti effettuati tra fine giugno e la seconda decade di luglio presenza di erbe infestanti. Ad oggi non ci sono principi attivi registrati su radicchio per il controllo delle infestanti a foglia larga in post emergenza e pertanto, in questi casi, si consiglia di effettuare una lavorazione dell'interfila quale fresatura e/o estirpatura con rifinitura manuale tra le piante. Sulle varietà a ciclo molto corto, effettuare una prima frazione di concimazione azotata.

ASPARAGO

Si segnala la presenza di ruggine (*Puccinia asparagi*): dopo aver valutato l'effettiva necessità del trattamento, intervenire con i prodotti presenti nel Disciplinare di Produzione Integrata del Veneto. La difesa risulta importante soprattutto nelle giovani asparagiaie, dove il patogeno può determinare un progressivo deperimento dell'impianto con conseguenze anche serie per la produzione negli anni successivi.

ZUCCA

Presenza di oidio su impianti dei vari periodi favorito dalle attuali condizioni climatiche in particolare forte umidità/nebbia nelle prime ore della mattina. Per la difesa intervenire alla comparsa dei primi sintomi e ripetere il trattamento ad intervalli da 7 a 14 giorni in relazione alla persistenza della sostanza attiva e all'andamento stagionale. Numerose le sostanze attive autorizzate contro questa avversità, che vanno da quelle di origine naturale a quelle che agiscono per contatto o quelle sistemiche (vedi le s.a. indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata del Veneto <https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata>).

PORRO

Possono essere presenti tripidi sulle foglie. Si consiglia di mantenere il terreno fresco, con un buon grado di umidità e un apparato fogliare turgido e carnoso, per garantire alle piante una continuità nello sviluppo anche se infestati da tripidi.

Con forte presenza, intervenire con i principi attivi indicati nel Disciplinare di Produzione Integrata del Veneto. Trattare nelle ore più fresche ed evitare le ore centrali, in quanto le temperature elevate (sopra i 35°C) incidono sull'efficacia e sull'emivita delle sostanze attive, piretroidi in particolare e aggiungere un olio vegetale, se la compatibilità dell'insetticida lo permette.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

POMODORO DA INDUSTRIA

I rilievi di campo effettuati nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto evidenziano gli effetti delle grandinate della settimana precedente. Le ferite sui tessuti vegetali hanno agevolato la penetrazione e la successiva diffusione di *Alternaria* e batteriosi, i cui sintomi sono oggi chiaramente visibili sulle piante. Tuttavia, considerato il forte rialzo termico in corso, si raccomanda di sospendere temporaneamente i trattamenti fitosanitari. Si consiglia di posizionare gli interventi alla prima finestra utile, non appena le temperature si saranno stabilizzate e in concomitanza con condizioni meteo favorevoli all'efficacia dei prodotti.

ORTICOLE IN SERRA

FRAGOLA

Sono praticamente terminati i trapianti delle varietà rifioranti nelle coltivazioni in fuori suolo e nonostante le temperature elevate del periodo risulta al momento un buon attecchimento generale delle giovani piantine. Si raccomanda di proseguire le irrigazioni sovrachioma che hanno più un effetto refrigerante che di apporto irriguo. Si segnala la presenza di piccoli focolai sia di ragnetto rosso che di afide ma al momento, visti anche i numerosi interventi di bagnatura fogliare, non sono consigliati interventi specifici. Procedere inoltre con il taglio di tutti i fiori presenti in modo di permettere un buon sviluppo della pianta.

POMODORO

Gravi danni da mancata allegagione si segnalano negli impianti di giugno in modo particolare su tipologia cuore di bue e, anche se in misura minore, su cultivar di pomodoro oblungo. La causa è da ricercarsi principalmente nelle condizioni climatiche dell'ultimo periodo caratterizzate da temperature molto elevate ed irraggiamento solare molto intenso. Si consiglia pertanto di ripristinare eventuale ombreggiamento delle serre ove precedentemente dilavato, intervenire con trattamenti fogliari usando prodotti a base di amminoacidi e alghe che aiutano a contrastare gli stress termici ed in caso di verificata carenza di polline all'interno del tubo pollinico dei fiori con apporti correttivi specifici a base di boro. Monitorare attentamente la presenza del lepidottero *Tuta absoluta* in forte aumento nell'ultimo periodo

MELANZANA

Su questa solanacea il problema principale riguarda attualmente il forte aumento degli attacchi di ragnetto rosso che in alcuni impianti sta compromettendo in maniera grave il futuro degli stessi. Dove si è deciso di intraprendere la strada della lotta con predatori specifici valutare lanci integrativi specialmente sui focolai più

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

evidenti mentre nelle aziende dove si è scelto la difesa tradizionale intervenire con prodotti specifici come indicato nel Disciplinare di Produzione Integrata del Veneto. Ricordiamo che anche le irrigazioni aeree aiutano in qualche modo a contenere il problema.