

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE ORTICOLE

Bollettino n. 21 del 20/08/2026

ORTICOLE IN PIENO CAMPO

POMODORO DA INDUSTRIA

I rilievi di campo effettuati nella settimana dal 10 al 16 agosto evidenziano gli effetti delle elevate temperature che hanno favorito sia la diffusione del ragnetto rosso, sia i fenomeni di lessatura delle bacche. Gli acaricidi impiegati la scorsa settimana hanno dimostrato una buona efficacia nei confronti del ragnetto. Si consiglia di eseguire un intervento con Caolino, con l'obiettivo di prevenire ulteriori scottature.

RADICCHIO TARDIVO

Si segnala presenza di ragnetto rosso su trapianti dalla terza decade di luglio alla prima di agosto. L'acaro è più diffuso negli appezzamenti adiacenti al mais. I sintomi sono piante bloccate con le foglie che si attorcigliano di colore verde scuro. Si consiglia, prima di effettuare qualsiasi intervento, di procedere con delle irrigazioni aeree se possibile poco battenti, cercare di irrigare con la goccia molto fine in modo da non sporcare le foglie di terra per rallentare l'acaro, mantenere il terreno fresco. Nel caso non si riducesse la popolazione si consiglia di intervenire con prodotti a base di maltodestrine o Sali di potassio degli acidi grassi. Nelle tipologie di radicchio precoce trapianti dal 10 luglio al 25 luglio prestare attenzione alla presenza di oidio. Con reale presenza intervenire con i principi attivi indicati nel Disciplinare di Produzione Integrata della regione Veneto (<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata>).

PORRO

In questo periodo si nota presenza di tripide e ragnetto rosso che provocano imbianchimenti della foglia, perdita di spessore e blocco della pianta. Mantenere il terreno fresco (buon grado di umidità), non costipato ma friabile (attraverso fresature ed estirpature continue) e un apparato fogliare turgido e carnoso. Nel caso l'infestazione fosse "pesante" si consiglia di intervenire contro il ragnetto rosso con Sali di potassio degli acidi grassi mentre contro il tripide con Spinosad o Olio di Arancio.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ORTICOLE IN SERRA

CETRIOLO

Si segnala presenza di ragnetto rosso su impianti in raccolta. Con inizio di infestazione intervenire con lanci di 10 individui/mq di *Phytoseiulus persimilis* con l'aggiunta di *Amblyseius californicus* (10 individui/mq).

Presenza di oidio sia su foglie vecchie che giovani. Con inizio di infestazione intervenire con principi attivi dedicati come indicato nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione del Veneto, preferendo le sostanze microbiologiche.

POMODORO

Rilevata la presenza di larve di *Tuta absoluta* nelle foglie specialmente su nuovi impianti. Asportare il più possibile le foglie colpite e successivamente intervenire con i principi attivi indicati nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione del Veneto, rispettando il dosaggio di etichetta contro questo insetto e aggiungere un olio vegetale se la compatibilità dell'insetticida lo permette.

In alcune aziende si nota presenza di eriofide (ingiallimenti delle foglie e bronzature del fusto); con i primi focolai si può intervenire con i principi attivi indicati nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione del Veneto.

FRAGOLA

Sono terminati i trapianti delle varietà rifiorenti negli impianti fuori suolo mentre in questa settimana iniziano quelli delle cultivar unifere che riguardano anche le coltivazioni tradizionali in suolo. Nonostante le elevate temperature dell'ultimo periodo gli attecchimenti delle giovani piantine risultano abbastanza buoni specialmente dove è stata eseguita un'adeguata strategia di irrigazione di supporto sia radicale che aerea mentre qualche problema in più si segnala nei casi dove si sono verificati sia degli eccessi che delle carenze di tali interventi. Da un punto di vista fitosanitario si sono notati i primi attacchi sia di ragnetto rosso che di afide ed anche la presenza di larve di piralide che inizialmente attaccano le gemme delle giovani piante causandone dapprima un appassimento generale e successivamente la morte delle stesse. In caso di necessità intervenire contro tali parassiti con prodotti specifici come indicato nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione del Veneto utilizzando quelli compatibili con lanci successivi di insetti utili.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

MELANZANA

Come riportato nelle precedenti note l'annata in corso ha visto come problema principale, che tuttora affligge gli impianti, la forte presenza di ragnetto rosso dovuto sicuramente alle alte temperature della stagione ed altrettanto alla difficoltà di contenimento dello stesso con i vari metodi di lotta. In concomitanza nell'ultimo periodo si sono notati nuovi attacchi di altica e di nottue che attaccano in maniera importante i giovani frutti con fori di penetrazione ben visibili a carico degli stessi ed infine del miride *Lygus r.* che gravi danni causa con le sue punture a carico dei piccoli abbozzi fiorali. Ove si manifesta la presenza di uno o più di questi fitofagi intervenire con una difesa adeguata seguendo le linee tecniche di difesa indicate nei disciplinari della regione Veneto.