

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE ORTICOLE

Bollettino n. 23 del 02/09/2026

ORTICOLE IN PIENO CAMPO

POMODORO DA INDUSTRIA

Peronospora e Alternaria: il precedente intervento ha contenuto le infezioni. Tuttavia, il recente aumento dell'umidità relativa e il prolungarsi della bagnatura fogliare creano condizioni favorevoli a possibili ripartenze dei patogeni. Si consiglia di eseguire un ultimo intervento di copertura con Rame metallo da poltiglia bordolese.

Note generali: nella settimana dal 24 al 30 agosto, l'andamento stagionale e lo stato di maturazione indicano che la raccolta terminerà indicativamente entro i prossimi 15-20 giorni.

Si comunica che, in vista della conclusione imminente della raccolta e nel rispetto dei tempi di carenza, è possibile sospendere definitivamente i trattamenti fitosanitari dopo l'ultimo intervento di copertura rameica consigliato.

RADICCHIO (LUNGO PRECOCE RACCOLTA ENTRO FINE OTTOBRE, LUNGO TARDIVO RACCOLTA ENTRO METÀ DICEMBRE), CICORIA

Prestare molta attenzione alla presenza di Miridi che per alimentarsi pungono nella parte interna della nervatura principale, che tende successivamente a lacerarsi con l'accrescimento della pianta. Intervenire con i principi attivi indicati nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale.

Verificare inoltre la presenza di danni causati da larve di nottue (*Spodoptera spp*), piralide defogliatrice (*Udea ferrugalis*), che vivono gran parte della loro vita sulle pagine inferiori erodendone l'epidermide o la costa delle foglie e da larve di piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*) che dopo la nascita penetrano all'interno del cespo e si nutrono scavando gallerie. Se necessario, effettuare un intervento insetticida indicato nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale.

BIETOLA

In questo periodo si possono riscontrare danni da larve di *Autographa gamma* e *Mamestra brassica* sulle foglie della coltura. In caso di presenza, intervenire con i principi attivi indicati nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale (<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata>).

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ORTICOLE IN SERRA

CETRIOLO

Si segnala presenza di ragnetto rosso su impianti in raccolta. Con inizio di infestazione intervenire con lanci di 10 individui/mq di *Phytoseiulus persimilis* con l'aggiunta di *Amblyseius californicus* (10 individui/mq). Nel caso di forte infestazione intervenire con i principi attivi indicati nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale, ponendo molta attenzione alla compatibilità dell'insetticida usato con gli insetti utili presenti. Presenza di oidio sia su foglie vecchie che su foglie giovani. Con inizio di infestazione intervenire con i principi attivi indicati nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale, preferendo le sostanze microbiologiche.

FRAGOLA

Siamo nella fase di pieno trapianto delle cultivar unifere sia negli impianti tradizionali che in quelli fuori suolo che sta proseguendo senza segnalazioni di particolari problemi di attecchimento. Nelle varietà rifiorenti ove necessario e se non già effettuato, procedere con un eventuale secondo taglio dei fiori necessario a rinforzare la pianta stressata dalle alte temperature dell'ultimo periodo e anche per la sicura scarsa qualità dei frutti che si potrebbero sviluppare. Porre molta attenzione da un punto di vista sanitario ai parassiti che possono essere presenti in questo periodo in modo particolare nottue, afidi e ragnetto rosso. Ove si rendesse necessario intervenire con prodotti specifici come indicato nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale, utilizzando sempre principi attivi compatibili con i futuri lanci di insetti utili. È altresì il momento di effettuare anche un intervento antioidico di prevenzione.

POMODORO

Sono iniziate le raccolte anche nelle serre dove sono stati effettuati gli ultimi trapianti di metà giugno, con prospettive di produzioni inferiori rispetto alla media degli ultimi anni a causa delle condizioni meteo dell'annata che hanno provocato notevoli perdite dovute principalmente a mancata allegagione, malformazioni di frutti, spaccature di questi e forte presenza di marciumi apicali. Per quanto concerne la situazione fitosanitaria si evidenzia una notevole presenza sia di *Tuta absoluta* che di altre tipologie di nottue, attacchi di ragnetto rosso e di eriofide rugginoso (localizzati), mentre l'oidio si manifesta anche in maniera molto evidente su varietà particolarmente sensibili. Per la difesa si raccomanda l'uso dei prodotti indicati nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale, attenzionando in modo scrupoloso i periodi di carenza degli stessi