

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

COLTURE ORTICOLE

Bollettino n. 27 del 30/09/2026

ORTICOLE IN PIENO CAMPO

LATTUGA

Rosure fogliari si rilevano in questo periodo causate da larve di lepidotteri del genere *Spodoptera*. Le larve si nutrono del lembo fogliare erodendo anche la nervatura principale. Per il controllo sono diverse le sostanze attive autorizzate e con reale presenza, impiegando le sostanze indicate nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale (<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata>).

CAVOLI (A INFIORESCENZA, A TESTA)

Con le attuali condizioni climatiche prestare attenzione ai focolai di peronospora e batteriosi. Con inizio di infezione, intervenire con prodotti specifici presenti nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale. Inoltre prestare attenzione a possibili infezioni di micosferella presenti sulle foglie (macchie circolari grigiastre o brune con zonature concentriche), che vanno controllate nella fase iniziale, con idonei prodotti (vedi Disciplinare di Produzione Integrata regionale).

RADICCHIO TARDIVO, PRECOCE, VARIEGATO, TONDO

Prima di effettuare la raccolta, accertarsi che il radicchio sia maturo come consistenza e come colore; non raccogliere prodotto sovra maturo o nel caso di radicchio tardivo materiale molto chiaro (poca presenza di foglie rosse). Monitorare la presenza di afidi all'interno dei cespi.

In queste tipologie sono presenti larve di lepidotteri che erodono la costa delle foglie e il cuore. Si consiglia di effettuare un intervento insetticida con prodotti presenti nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale. In alcuni appezzamenti, presenza di macchie di sclerotinia che si manifesta con muffa biancastra cotonosa alla base della pianta colpendo le prime foglie e il colletto. Asportare e distruggere i cespi ammalati, ridurre le irrigazioni e concimazioni azotate, adottare ampie rotazioni ed intervenire con prodotti specifici presenti nel Disciplinare di Produzione Integrata regionale.

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

ORTICOLE IN SERRA

FRAGOLA

Siamo in piena raccolta sulle varietà principalmente rifiorenti, negli impianti fuori suolo, mentre siamo ad inizio in quelle prettamente unifere in suolo. Si sta lentamente allentando la pressione dei vari nottuidi mentre si segnalano aumenti di focolai di ragnetto rosso, per i quali è il momento di effettuare dei lanci di antagonisti specifici. Visto il proseguo delle ottime condizioni meteo e con una oculata gestione dell'arieggiamento delle serre, non vengono rilevati problemi di botrite o di antracnosi, mentre si stanno riscontrando i primi sintomi sia su foglia che su frutti di attacchi di oidio in special modo su varietà particolarmente sensibili e per le quali si consiglia di intervenire con prodotti mirati come consigliato Disciplinare di Produzione Integrata regionale ponendo particolare attenzione al rispetto dei periodi di carenza.

INSALATA

La raccolta dei primi trapianti estivi sta terminando e in diverse zone si notano danni importanti da nottue che vanno a compromettere la commerciabilità del prodotto. Proseguire quindi con molta attenzione il monitoraggio anche se nell'ultima settimana grazie anche all'abbassamento delle temperature minime si nota un calo abbastanza significativo dei voli degli adulti. Si stanno riscontrando sui nuovi trapianti delle difformità di crescita delle giovani piante dovuti quasi sempre a problemi di uniformità di irrigazioni con conseguente disseccamento del cubetto ma talvolta alla presenza, anche importante di nematodi con galle ben evidenti sugli apparati radicali. Risulta difficile il contenimento del problema sia per la scarsità di prodotti autorizzati sulla coltura sia nell'eventuale applicazione degli stessi poiché in diverse aziende si adotta esclusivamente il metodo di irrigazione per aspersione.