



Bollettino n. 20 del 27 agosto 2026

VITE

Andamento meteo (in collaborazione col Servizio Meteorologia e Climatologia di Arpav):


La settimana è stata interessata da alcune perturbazioni che hanno alternato giornate soleggiate ad eventi piovosi diffusi, con qualche limitato episodio grandinigeno. L'attuale settimana è iniziata con giornate soleggiate e temperature in graduale aumento. Le temperature massime e minime medie rispettivamente sono risultate comprese tra 28-32°C e tra 18-22°C. Le precipitazioni hanno interessato tutto il territorio veneto con cumuli mediamente compresi tra 40-75 mm nella zona centro orientale e tra 20-50 mm nelle restanti zone.

MEDIA DELLE TEMPERATURE MASSIME E MINIME DAL 19/08 al 25/08 - ARPAV



Temperatura aria media delle massime giornaliere (t_{max})
dal 19/08/2026 al 25/08/2026

Elaborazione a cura del
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio





Spazializzazione con Kriging senza nessun aggiustamento per quota/esposizione.
Mappa elaborata il 26/08/2026 alle 07:00 solari con dati non validati.



Temperatura aria media delle minime giornaliere (t_{min})
dal 19/08/2026 al 25/08/2026

Elaborazione a cura del
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio





Spazializzazione con Kriging senza nessun aggiustamento per quota/esposizione.
Mappa elaborata il 26/08/2026 alle 07:00 solari con dati non validati.

PRECIPITAZIONI E GIORNI PIOVOSI DAL 19/08 AL 25/08 - ARPAV



Precipitazione cumulata (mm)
dal 19/08/2026 al 25/08/2026

Elaborazione a cura del
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio





Spazializzazione con Kriging senza nessun aggiustamento per quota/esposizione.
Mappa elaborata il 26/08/2026 alle 07:00 solari con dati non validati.



Numero di giorni piovosi (≥ 1 mm)
dal 19/08/2026 al 25/08/2026

Elaborazione a cura del
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio



Spazializzazione con Kriging senza nessun aggiustamento per quota/esposizione.
Mappa elaborata il 26/08/2026 alle 07:00 solari con dati non validati.





**Fase fenologica:**


Le varietà a media maturazione hanno raggiunto la loro piena maturazione e sono in corso di raccolta. Le varietà tardive (ad es. i Rabosi, ecc.) proseguono il processo di addolcimento degli acini verso la piena maturazione. Si conferma anche per quest'ultime l'anticipo di circa una settimana rispetto alla stagione scorsa.

Vitigno	BBCH medio, ambienti tardivi		BBCH medio, ambienti precoci	
Pinot, Chardonnay	89		89	
Corvine, Merlot	85-89		89	
Glera	85		89	
Garganega, Cabernet S.	85		89	
	Chiusura del grappolo 77 (L) 	Inizio invaiatura 81 (M) 	Invaiatura 83-85 	Piena maturazione 89 (N) 



Fasi in diversi ambienti, rispettivamente da sx: Corvina (F. Bonomi, S.P. in Cariano - VR, 21/08); Moscato giallo (D. Fornasiero, Baone - PD, 24/08); Glera (D. Fornasiero, Alonte - VI, 24/08).





Grafici: Curve di maturazione (acidità totale e zuccheri) e curve di pH rispettivamente di Pinot grigio, Chardonnay, Glera e Merlot in un vigneto storico a Istrana – TV. Il confronto è tra il 2026 (linee scure con pallini) e le annate dal 1992 al 2025 (linea arancione Acidità, linea rosso scuro Zuccheri).

Da notare: Le dinamiche della maturazione evidenziano per tutte le varietà analizzate e in tutte le aree viticole trevigiane, valori degli zuccheri elevati, probabilmente anche per perdita di acqua; acidità bassa almeno per la Glera considerando gli obiettivi enologici ed il pH è al limite per una fermentazione ottimale. Gli acidi, soprattutto nei valori del malico, sono molto bassi. Questa situazione delle uve ricorda quella del 2003 con andamento meteo-climatico molto simile a quello del 2026 (*Extenda vitis*, 26/08).

	24/8						
	BRIX	BABO	AC. TOT	pH	APA	AC. TARTARICO	AC. MALICO
MEDIA DOCG ASOLO	16,4	14,1	5,9	3,38	130	6,8	2,3
MEDIA DOCG CONEGLIANO-VALDOBBIADENE	16,8	14,4	5,2	3,39	97	6,9	1,6
MEDIA PROSECCO DOC	16,0	12,7	6,2	3,36	125	6,6	2,6
MEDIA PROSECCO DOC PD	17,0	14,6	4,9	3,39	108	6,9	1,4
MEDIA PROSECCO DOC VI	16,3	14,0	4,8	3,42	90	6,7	1,4
MEDIA PROSECCO DOC TV	16,6	14,3	5,5	3,39	99	6,9	1,9
MEDIA PROSECCO DOC VE	17,2	14,8	5,2	3,40	111	7,0	1,5
MEDIA PROSECCO DOC UD	16,7	14,3	5,3	3,41	131	6,8	1,9
MEDIA PROSECCO DOC PN	15,5	13,3	5,8	3,38	113	6,9	2,1
MEDIA PINOT GRIGIO	VENDEMMIATI						
MEDIA MERLOT	16,5	14,2	4,8	3,45	132	6,5	1,9
MEDIA CHARDONNAY	20,45	17,587	5,6	3,52	180	8,4	2,05

Tabella: Dati analitici delle analisi dei mosti delle uve Glera in diverse province delle aree viticole venete, Pinot grigio, Merlot e Chardonnay (*Extenda vitis*, 26/08).

Stato parassitario:

Patogeni: Nessuna novità di rilievo. Solo sporadiche comparse di macchie secondarie di Peronospora e infezioni Oidiche su femminelle in seguito alle ultime piogge o in vigneti non ben difesi in precedenza.

Botrite (*Botrytis cinerea*) e Marciume acido: Rare segnalazioni in vigneti in precedenza irrigati sovra-chioma e con chiome folte e ricadente.

Tignoletta (*Lobesia botrana*): In vigneto si osserva la presenza soprattutto di larve mature di quinta età (L5) e crisalidi della terza generazione.

Cocciniglie (*Planococcus ficus*, *Pseudococcus comstocki*, *Parthenolecanium corni* e *Neopulvinaria innumerabilis*): All'interno dei grappoli, se non ancora vendemmiati, o sulle mummie nel caso di vendemmia meccanica, si osserva la presenza delle diverse forme mobili dell'insetto. Al contempo, si rileva l'abbondante presenza di formiche, nuova melata e fumaggini diffuse.

Cicalina *Scaphoideus titanus*: Nei vigneti si può ancora riscontrare la presenza di qualche adulto, ma in netta diminuzione.

Altre cicaline (*Erasmoneura vulnerata*, *Empoasca vitis*, *Zygina rhamni*): Si osserva la presenza soprattutto degli adulti di seconda generazione.

In vigneto e durante il periodo estivo oltre alla presenza delle ormai note cicaline sopra citate, è possibile riconoscere, soprattutto con l'ausilio delle trappole cromotropiche gialle, anche altre specie di Cicadellidi, quali potenziali vettori di Giallumi (FD e LN) della vite (vedi foto sotto).

Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*): Nessuna segnalazione.

***Epuraea* sp. (Coleoptera, Nitidulidae):** Nessuna segnalazione.

Mal dell'Esca: I sintomi sono ben evidenti su molte varietà.



Virosi dell'accartocciamento fogliare (Grapevine Leaf Roll associated Virus - GLRaV): Si segnala, soprattutto su Pinot grigio, la presenza di evidenti sintomi riconducibili a questa virosi, che rispetto ai sintomi provocati da FD e LN le nervature rimangono verdi e i grappoli non disseccano.



Foto da sx: Larva di quinta età di Tignoletta. Nido larvale con rosure da Tignoletta. Adulto di *Epuraea* sp. Acino svuotato per attività di *Epuraea* sp. (foto di E. Marchesini). Per vedere gli adulti, uova e le prime larve di Tignoletta cliccare sul link: <https://youtu.be/acGkxhhCaBE>




Foto da sx: *P. comstocki* su grappolo in seguito a raccolta meccanica (foto di Gottardi). Forme mobili di *P. ficus* su grappolo. Alta infestazione di *P. ficus* su grappolo (foto di E. Marchesini); Acini colpiti da Botrite e Marciume acido (Foto di *Extenda vitis*). Per vedere il video sugli adulti di *P. ficus* cliccare sul link: <https://youtu.be/J6a0eTu0Htk>




Foto da sx. Adulto di: *Scaphoideus titanus*, *Orientus ishidae* e *Dictyophara europaea* (in alto) per quanto riguarda i vettori accertati e potenziali di Flavescenza dorata. Adulto di *Hyalesthes obsoletus*, *Laodelphax striatella* e *Dicanotropis hamata* (in basso) per quanto riguarda i vettori accertati e potenziali di Legno Nero (Foto di E. Marchesini).

**Indirizzi di difesa:**

Solo sulle varietà tardive (ad es. Rabosi, Corvina, ecc.), dove sono presenti reinfezioni sull'ultima vegetazione, ma anche nei vigneti recentemente grandinati, è ancora consigliato rinnovare, a necessità, la copertura antiperonosporica ed antioidica con Rame e Zolfo a dosaggi medio-bassi, rispettando i tempi di carenza e le altre prescrizioni riportate in etichetta. In tutti gli altri casi la campagna di difesa può ritenersi conclusa.

Botrite (*Botrytis cinerea*): In seguito alle ultime piogge e su varietà tardive a grappolo compatto, si consiglia di monitorare l'eventuale sviluppo di infezioni e di valutare un intervento con prodotti di origine naturale (a base microbiologica o terpenica o bicarbonato di potassio).

Cocciniglie (*Planococcus ficus*, *Pseudococcus comstocki* e *Parthenolecanium corni*): Nel caso di focolai di cocciniglie farinose, si consiglia di effettuare dei lanci con il parassitoide *Anagyrus vladimiri* in post vendemmia, allo scopo di abbassarne la pressione nei vigneti.

Flavescenza dorata:

Aldilà delle popolazioni del vettore, come sempre, si raccomanda di continuare ad eseguire periodicamente i controlli sulla presenza di piante colpite da Giallumi e di capitozzarle prontamente in attesa dell'estirpazione autunno-invernale, come stabilito dal vigente Decreto di Lotta Obbligatoria contro la Flavescenza dorata.

NOTA INFORMATIVA:

- Pubblicazione sul BUR n. 111 del 14/08/2026 del Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario n. 17140 del 11/08/2026, con oggetto: Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2026, destinate alla produzione dei vini delle DOCG "Conegliano Valdobbiadene Prosecco", DOCG "Asolo Prosecco" e DOC Prosecco.
- Pubblicazione da parte di AVEPA con prot. 192438/2026 del 06/08/2026 - rep. 1450/2026 - class. VI/2, con oggetto: Determinazione delle rese massime di uva per ettaro dei vigneti atti alla produzione dei vini delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche della provincia di Verona colpiti dagli eventi atmosferici di carattere grandinigeno verificatisi in data 2 giugno 2026 e 1° luglio 2026.

NB: Ultimo bollettino Viticolo della stagione 2026.