Bollettino n. 7 del 20 maggio 2026

VITE

Andamento meteo (in collaborazione col Servizio Meteorologia e Climatologia di Arpav)**:**

La maggior parte della settimana è stata caratterizzata da fasi di tempo instabile con precipitazioni diffuse e abbondanti in alcuni areali del territorio veneto. Le temperature medie massime e minime hanno subito un forte diminuzione e rispettivamente sono risultate comprese tra 14-18°C e tra 8-10°C a seconda delle zone. Le precipitazioni cumulate dell'ultima settimana sono risultate più abbondanti nella fascia centro-settentrionale della Regione con cumuli fino a 50-60 mm; nelle altre zone si sono verificate precipitazioni tra i 20-30 mm e inferiori (8-15 mm) nella parte più a sud.
Le medie settimanali delle temperature massime e minime rispetto alla media del periodo storico, sono risultate inferiori in un range compreso tra 2 e 5°C a seconda delle zone.

MEDIA DELLE TEMPERATURE MASSIME E MINIME DAL 13/05 al 19/05 - ARPAV





SCARTO TEMPERATURE MAX E MIN RISPETTO ALLA NORMA DAL 13/05 AL 19/05 - ARPAV





PRECIPITAZIONI E GIORNI PIOVOSI DAL 13/05 al 19/05 - ARPAV





Fase fenologica

Le condizioni metereologiche, in particolare la diminuzione delle temperature, ha comportato un rallentamento delle fasi di allungamento dei germogli e di fioritura. Generalmente si osserva la piena fioritura

nelle varietà medio-precoci in tutti gli areali viticoli, mentre in quelle tardive i bottoni fiorali dei grappolini risultano ben separati e distesi. In alcune zone notoriamente più calde, si segnala la fine della fioritura della varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Corvina, ecc.). Tuttavia, come già segnalato in precedenza, in alcuni comprensori permangono le condizioni di difformità di sviluppo, anche tra vigneti della stessa varietà nelle medesime condizioni ambientali.

Vitigno	BBCH medio, ambienti tardivi	BBCH medio, ambienti precoci
Pinot, Chardonnay	62-63	65-67
Corvine, Merlot	61-62	65-67
Glera	57-61	63-65
Garganega, Cabernet S.	57	61



Fasi in diversi ambienti: Corvina (*F. Bonomi, S.P. in Cariano - VR, 19/05*), Merlot (*D. Fornasiero, Alonte - VI, 19/05*), Chardonnay (*Extenda vitis, Annone veneto – VE, 19/05*)







Fenogrammi 2025-2026 a confronto con la media 1986-2025 su un vigneto di Glera, Chardonnay e Merlot a Istrana (*Extenda vitis, 20/05*).

Stato parassitario:

Patogeni: Nell'ultima settimana non sono emerse nuove infezioni primarie di Peronospora in seguito alle piogge verificatesi nell'ultimo periodo. **Per Oidio si rileva la presenza di sporadiche nuove infezioni nei testimoni non trattati** e in alcuni vigneti storicamente più favorevoli allo sviluppo di questi patogeni. Inoltre, continuano le **segnalazioni di evidenti sintomi riconducibili ad Escoriosi e Black rot** in molte zone viticole del territorio veneto.

Le simulazioni aggiornate dei DSS disponibili relative a due località del veronese indicano, per il prossimo periodo, un medio-alto rischio di infezioni sia per la Peronospora sia per l'Oidio ed il Black rot (vedi grafici in fondo al bollettino).

Tignoletta (*Lobesia botrana*): Nei vigneti oggetto di studio della fenologia si riscontrano larve dalla seconda alla quarta età (L2-L4). Inoltre, si possono osservare i nidi larvali costituiti dai fili sericei tra i bottoni fiorali.

Cocciniglie (*Planococcus ficus, Pseudococcus comstocki, Parthenolecanium corni e Neopulvinaria innumerabils*): Si riscontra la presenza delle neanidi di diverse età di ***P. ficus*** e ***P. comstocki*** sulle foglie, lungo i germogli e nei grappolini. Non è ancora iniziata la schiusura delle uova della cocciniglia ***P. corni,*** mentre le femmine di ***N. innumerabils*** (Pulvinaria) si possono osservare lungo il cordone della vite. Per quest'ultime la fase di schiusura delle uova e la migrazione delle neanidi bisognerà attendere la fine di giugno. Sono iniziate le catture degli adulti di ***P. ficus*** su trappola.

Cicalina *Scaphoideus titanus*: Da ieri l'altro è iniziata l'attività di monitoraggio della fenologia del vettore della Flavescenza dorata che proseguirà a cadenza settimanale fino alla comparsa delle forme adulte.

I rilievi eseguiti nei siti di riferimento presso varie località a diversa altimetria nel territorio regionale rivelano che c'è attualmente una bassa consistenza di forme giovanili, prevalentemente nello stadio di 1° età ma con una frazione di 2° età già di rilievo negli ambienti più anticipati (vedi grafico sotto).

Rispetto allo scorso anno il ciclo dell'insetto risulta, ad oggi, in anticipo di circa 5-7 giorni.



Cicalina maculata (*Erasmoneura vulnerata*): In questa fase, sono presenti i primi stadi (N1 e N2) delle forme giovanili della cicalina.

Altre cicaline (*Empoasca vitis, Zygina rhamni*): In vigneto si osservano le forme giovanili (neanidi e ninfe) e la presenza degli adulti svernanti.

Fillossera (*Daktulosphaira vitifoliae*): Continuano le segnalazioni relative la presenza delle galle di colore rossastro sulle foglie basali.

Virosi e Fitoplasmi (Virosi del Pinot grigio - GPGV, Flavescenza dorata – FD, Legno nero - LN): Continuano le segnalazioni di comparsa di sintomatologie precoci da FD sulle viti già infettate lo scorso anno, così come quelli della virosi GPGV su Glera, Garganega e Pinot grigio.

Foto: Danni da Oidio su grappolo (a sx; *Extenda vitis*); Infezione primaria di Peronospora (al centro; *G. Posenato*); Sintomi di Black rot (a dx; *G. Posenato*)

Foto: Nido larvale di Tignoletta su grappolo (a sx; foto di *F. Bonomi*); Nido larvale (glomeruli) di Tignoletta (al centro; foto di *E. Marchesini*); Larva di terza età di Tignoletta (a dx) (foto di *E. Marchesini*)



Foto: Neanide di *E. vitis* (a sx); Neanide di *E. vulnerata* (a centro-sx); Neanide di seconda età di *S. titanus* (centro-dx) (Foto di *E. Marchesini*); Presenza su foglia di neanidi di prima e seconda età di *S. titanus* (sx; foto di *Extenda vitis*)

Neanidi di *P. ficus* su foglia (a sx); Neanide di *P. comstocki* su foglia (al centro); Femmina di *N. innumerabils* con sacco ovigero (a dx) (foto di *E. Marchesini*)

Indirizzi di difesa:

In tutti i comprensori viticoli, in seguito alle precipitazioni degli ultimi giorni, è necessario valutare la tempestiva ricopertura antiperonosporica ed antioidica. Le valutazioni delle sostanze attive da impiegare devono tenere conto delle strategie di difesa aziendali prescelte. Si consiglia, in generale, di impiegare le usuali sostanze attive di contatto (es. folpet/rame + zolfo liquido/bagnabile) eventualmente addizionate di fosfonati/fosetil di alluminio o formulati endoterapico-sistemici negli areali notoriamente più sensibili o situazioni in cui sono già state osservate di infezioni nei giorni scorsi.

Tignoletta (*Lobesia botrana*): In questa fase non sono previsti interventi specifici, salvo nei casi in cui si riscontra il superamento della soglia di intervento, pertanto si consiglia di monitorare la presenza dei nidi larvali sui grappolini.

Cocciniglie (*Planococcus ficus, Pseudococcus comstocki e Parthenolecanium corni*): Nei vigneti in cui lo scorso anno manifestavano un'alta infestazione, è ancora possibile programmare un intervento insetticida specifico

non appena le condizioni metereologiche siano stabili. Inoltre, è possibile programmare dei lanci del parassitoide *Anagyrus vladimiri* ed eventualmente da integrare con i lanci del predatore *Cryptolaemus montrouzieri*.

Cicalina *Scaphoideus titanus*: Si raccomanda di fare molta attenzione al prossimo Bollettino nel quale verrà comunicata la tempistica per l'esecuzione del 1° trattamento obbligatorio contro lo *Scaphoideus titanus* per tutte le realtà vitate che devono eseguire 3 interventi insetticidi, secondo quanto stabilito al punto 5 a) del Decreto di Lotta Obbligatoria n. 13645 del 14 maggio 2026, cioè le aziende in gestione biologica ai sensi del Reg UE 2018/848 e le aziende in gestione convenzionali che non prevedono l'impiego esclusivo di insetticidi di sintesi contro il vettore di Flavescenza dorata. Nella tabella (in fondo) sono riportati i prodotti fitosanitari ad oggi presenti in commercio per le sostanze attive ammesse dal decreto di lotta obbligatoria.

Altre cicaline (*Erasmoneura vulnerata, Empoasca vitis, Zygina rhamni*): Nel caso di forti infestazioni e al superamento delle soglie di intervento si può intervenire con l'utilizzo di insetticidi specifici.

Fillossera (*Daktulosphaira vitifoliae*): In caso di forti attacchi si può intervenire con insetticidi specifici.

Virosi e Fitoplasmi (Virosi del Pinot grigio - GPGV, Flavescenza dorata – FD, Legno nero - LN): Le viti che presentano sintomi da **Giallumi (FD e LN)** devono essere rapidamente estirpate, come stabilito dal vigente Decreto di Lotta Obbligatoria contro la Flavescenza dorata. In caso di dubbi di riconoscimento, fare riferimento alle foto contenute nella Guida divulgativa "I Giallumi della vite in Veneto", reperibile nel sito istituzionale dell'UO Fitosanitario: https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/home

Altre indicazioni: Si consiglia di completare rapidamente la spollonatura dei fusti.

Lo sfalcio/trinciatura degli interfilari può essere realizzato successivamente, meglio se a file alterne per favorire il ripopolamento dell'entomofauna utile.

Negli allevamenti in parete, dopo il completamento della pulizia della vegetazione avventizia sulle teste e lungo il fusto è necessario procedere rapidamente all'operazione di palizzamento per assicurare entro i fili di coppia i germogli sviluppati che tendono verso il basso e al centro dell'interfila; al contempo si fa attenzione a riordinare e distribuire i germogli per evitare gli affastellamenti e garantire così una migliore copertura dei trattamenti sulla superficie fogliare.

Nota informativa:

Nel sito istituzionale dell'UO Fitosanitario (https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/home), sono stati pubblicati:

- il Decreto Dirigenziale (DDir. n. 13645 del 14 maggio 2026) relativo "Misure di Lotta Obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2026";
- il Testo Consolidato con l'aggiornamento di aprile delle Linee Tecniche di Produzione Integrata.

DF





Modello Peronospora RIMPro: grafici del rischio infettivo stimato a Ronco all'Adige e a Montecchia di Crosara - VR (*G. Posenato*).





Modello Oidio RIMPro: grafici del rischio stimato a Montecchia di Crosara e a Brenton di Roncà - VR (*G. Posenato*).



Modello Black rot RIMPro: grafici del rischio stimato a Montecchia di Corsara - VR (*G. Posenato*).

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive ammesse dal Decreto di Lotta Obbligatoria 2026 registrati per l'impiego su Vite contro "Scaphoideus titanus" e/o contro "Cicaline"

elaborazione su dataset BDF srl dei PF a catalogo al 5 maggio 2026

Prodotto Fitosanitario	Sostanza attiva	Bio	Avversità registrate	Note PF art.53 Reg (CE) 1107/2009
ABANTO	Piretrine (40 g/l)	Si	Scaphoideus, Cicaline	
ASSET DUO	Piretrine (18,61 g/l)	Si	Scaphoideus	
ASSET FIVE	Piretrine (46,5 g/l)	Si	Cicaline	
ATLAS	Lambda-cialotrina (100 g/l)	No	Cicaline	
AUDACE SC	Deltametrina (15,7 g/l)	No	Cicaline	
BEMOTIUS	Azadiractina (26 g/l)	Si	Scaphoideus, Cicaline	
BIOPIREN PLUS	Piretrine (18,61 g/l)	Si	Scaphoideus	
BIOVIS	Piretrine (18,61 g/l)	Si	Scaphoideus	
CELL	Deltametrina (25 g/l)	No	Cicaline	
CLOSER	Sulfoxaflor (120 g/l)	No	Scaphoideus	impiego consentito fino al 28/08/2026
CORDOBA	Lambda-cialotrina (100 g/l)	No	Cicaline	
DECIS EVO	Deltametrina (25 g/l)	No	Scaphoideus	
DELTAGRI	Deltametrina (25 g/l)	No	Scaphoideus	
DELTAMIX 25	Deltametrina (25 g/l)	No	Cicaline	
DELTASAP	Deltametrina (25 g/l)	No	Cicaline	
DELTASEC	Deltametrina (25 g/l)	No	Cicaline	
DEMETRINA FLOW	Deltametrina (15,7 g/l)	No	Cicaline	
DISHA	Deltametrina (25 g/l)	No	Cicaline	
EPIK SL	Acetamiprid (50 g/l)	No	Scaphoideus	
ERADICOAT MAX	Maltodestrina (40%)	Si	Scaphoideus	
ESSEN'CIEL	Olio di arancio (60 g/l)	Si	Cicaline	
EVURE PRO	Tau-fluvalinate (240 g/l)	No	Scaphoideus	
FLIPPER	Sali di potassio degli acidi grassi (479,8 g/l)	Si	Cicaline	
FORZA	Lambda-cialotrina (2,5%)	No	Cicaline	
GLORIAL 25 EC	Deltametrina (25 g/l)	No	Scaphoideus	
JUDO	Lambda-cialotrina (100 g/l)	No	Cicaline	
KAIMO SORBIE	Lambda-cialotrina (5%)	No	Scaphoideus	
KARAKAS	Lambda-cialotrina (100 g/l)	No	Cicaline	
KARATE ZEON	Lambda-cialotrina (100 g/l)	No	Cicaline	
KARATE ZEON 1.5	Lambda-cialotrina (15 g/l)	No	Cicaline	
KEMPO SORBIE	Lambda-cialotrina (5%)	No	Scaphoideus	
KESTREL	Acetamiprid (200 g/l)	No	Scaphoideus	
LAMDEX EXTRA	Lambda-cialotrina (2,5%)	No	Cicaline	
LIMOCIDE	Olio di arancio (60 g/l)	Si	Cicaline	
LINCE	Piretrine (40 g/l)	Si	Scaphoideus, Cicaline	
LUMIX BIO	Piretrine (40 g/l)	Si	Scaphoideus, Cicaline	
MARKATE PLUS 100 CS	Lambda-cialotrina (100 g/l)	No	Cicaline	
MAVRIK SMART	Tau-fluvalinate (240 g/l)	No	Scaphoideus	
METEOR	Deltametrina (15,7 g/l)	No	Cicaline	
NATUR BREAKER	Piretrine (40 g/l)	Si	Scaphoideus, Cicaline	
NATURALIS	Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 (0,01	Si	Scaphoideus	
NEEMAZAL-T/S	Azadiractina (10 g/l)	Si	Cicaline	
NEEMIK TEN	Azadiractina (10 g/l)	Si	Cicaline	
NINJA	Lambda-cialotrina (2,5%)	No	Cicaline	
NINJA L	Lambda-cialotrina (15 g/l)	No	Cicaline	
OIKOS	Azadiractina (26 g/l)	Si	Cicaline	
OIKOS TOP	Azadiractina (10 g/l)	Si	Cicaline	
ORO-QUIN	Olio di arancio (60 g/l)	Si	Cicaline	
PIRECRIS	Piretrine (20 g/l)	Si	Scaphoideus	
PIREFLOR	Piretrine (18 g/l)	Si	Scaphoideus	
PIRETRO ACTIGREEN	Piretrine (18,61 g/l)	Si	Scaphoideus	
PIRETRO NATURA	Piretrine (40 g/l)	Si	Scaphoideus, Cicaline	
PIRETRO VERDE	Piretrine (18,61 g/l)	Si	Scaphoideus	
POLECI	Deltametrina (25 g/l)	No	Cicaline	
PREV-AM PLUS	Olio di arancio (60 g/l)	Si	Cicaline	
PYREGARD	Piretrine (40 g/l)	Si	Scaphoideus, Cicaline	
RABONA	Piretrine (46,5 g/l)	Si	Cicaline	
RAVANE PLUS 100 CS	Lambda-cialotrina (100 g/l)	No	Cicaline	
SHUNTA	Piretrine (40 g/l)	Si	Scaphoideus, Cicaline	
SINALA	Olio di arancio (60 g/l)	Si	Cicaline	
SIVANTO PRIME	Flupyradifurone (200 g/l)	No	Scaphoideus	
SUMIALFA ECHO	Esfenvalerate (15 g/l)	No	Cicaline	
SUPER DELTA	Deltametrina (25 g/l)	No	Cicaline	
SURROUND WP CROP PROTECTANT	Silicato di alluminio (caolino) (95%)	Si	Scaphoideus	impiego consentito fino al 29/07/2026
TERSUS	Piretrine (12,9 g/l)	Si	Scaphoideus	
TREBON UP	Etofenprox (287,5 g/l)	No	Scaphoideus	