

## Bollettino n. 9 del 3 giugno 2026

### VITE

Andamento meteo (in collaborazione col Servizio Meteorologia e Climatologia di Arpav):


Settimana caratterizzata da fasi alternate, con giornate soleggiate e calde ed altre più fresche con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporali associati a forti grandinate e fenomeni ventosi che hanno provocato danni in diverse zone del territorio veneto. Le temperature massime e minime medie rispettivamente sono risultate comprese tra 28-32°C e tra 18-22°C. Le precipitazioni, sono risultate abbondanti in alcune zone con cumuli tra i 70 e 100 mm, in altre il range di pioggia è stato compreso tra 30-50 mm. Solo in alcune zone circoscritte i quantitativi sono stati decisamente inferiori e compresi tra 8-10 mm.

Le medie settimanali delle temperature massime e minime rispetto alla media del periodo storico, sono risultate superiori in un range compreso tra 2 e 5°C, a seconda delle zone.


**MEDIA DELLE TEMPERATURE MASSIME E MINIME DAL 27/05 al 2/06 - ARPAV**



Temperatura aria media delle massime giornaliere (t<sub>max</sub>)  
dal 27/05/2026 al 02/06/2026  
Elaborazione a cura del  
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio




Temperatura aria media delle minime giornaliere (t<sub>min</sub>)  
dal 27/05/2026 al 02/06/2026  
Elaborazione a cura del  
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio




**PRECIPITAZIONI E GIORNI PIOVOSI DAL 27/05 al 2/06 - ARPAV**







Precipitazione cumulata (mm)  
dal 27/05/2026 al 02/06/2026  
Elaborazione a cura del  
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio



Numero di giorni piovosi (>= 1mm)  
dal 27/05/2026 al 02/06/2026  
Elaborazione a cura del  
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio



**SCARTO TEMPERATURE MAX E MIN RISPETTO ALLA NORMA DAL 27/05 AL 2/06 - ARPAV**



### Fase fenologica:

L'allungamento dei germogli continua in maniera molto rapida; la fioritura è ormai ultimata in pianura anche nelle varietà tardive, mentre in alcune zone di collina se ne osserva ancora la fioritura. Nella maggior parte degli areali viticoli, le varietà medio-precoci risultano tra la piena allegagione e l'inizio dello sviluppo degli acini.



allo stadio di “grano di pepe” o “piccolo pisello”. Per alcune varietà precoci (Pinot e Chardonnay) caratterizzate da grappolo compatto, si inizia a considerare la pre-chiusura del grappolo soprattutto in ottica dei trattamenti antibotritici.



| Vitigno                | BBCH medio, ambienti tardivi | BBCH medio, ambienti precoci |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pinot, Chardonnay      | 71-73                        | 73-75                        |
| Corvine, Merlot        | 69-71                        | 71-75                        |
| Glera                  | 69-71                        | 71-73                        |
| Garganega, Cabernet S. | 62-63                        | 69-71                        |

|                                     |                                      |                                 |                                   |                                                                   |                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Piena fioritura</b><br>65<br>(I) | <b>Fine della fioritura</b><br>67-69 | <b>Allegagione</b><br>71<br>(J) | <b>Sviluppo degli acini</b><br>73 | <b>Sviluppo degli acini (stadio piccolo pisello)</b><br>75<br>(K) | <b>Chiusura del grappolo</b><br>77<br>(L) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|



Fasi in diversi ambienti: Corvina (a sx; F. Bonomi, S.P. in Cariano - VR, 1/06); Glera (centro-sx; Baone - PD), Chardonnay (centro-dx; Baone - PD); Merlot (dx; Alonte - VI) (D. Fornasiero, 1/06)



Grafici dell'allungamento dei germogli di alcune varietà nel 2026 (rilevi rappresentati dai puntini) a confronto con l'anno precedente (linea più scura) a Istrana (*Extenda vitis*, 3/06); la serie di linee più chiare rappresenta la storicità dei rilievi eseguiti.

**Stato parassitario:**

Patogeni: Sono emerse le prime e sporadiche “macchie d’olio” di *Peronospora* anche nei vigneti trattati, mentre per l’Oidio si segnalano rare macchie derivanti da infezioni secondarie nei testimoni non trattati soprattutto in collina e in alcune zone più favorevoli allo sviluppo di questo patogeno.


Le simulazioni aggiornate dei DSS disponibili relative a due località del veronese indicano, per il prossimo periodo, un alto rischio di infezioni per *Peronospora*, Oidio e Black rot (vedi grafici in fondo al bollettino).

Tignoletta (*Lobesia botrana*): Nei vigneti oggetto di studio della fenologia si riscontrano perlopiù larve di quinta età (L5) e crisalidi di prima generazione. Si conferma l’inizio delle catture degli adulti di seconda generazione.

Cocciniglie (*Planococcus ficus*, *Pseudococcus comstocki*, *Parthenolecanium corni* e *Neopulvinaria innumerabilis*): Si conferma la presenza delle neanidi di diverse età di *P. ficus* e *P. comstocki* sulle foglie, lungo i germogli e nei grappoli, e l’inizio della schiusura delle uova della cocciniglia *P. corni* e se si osserva una blanda migrazione delle neanidi.

Cicalina *Scaphoideus titanus*: Il terzo rilievo fenologico territoriale dello *Scaphoideus titanus* compiuto tra ieri e ieri l’altro rivela che in quest’ultima settimana c’è stata una comparsa significativa di individui di prima età, assieme al ritrovamento di rari individui di terza età che stanno evolvendo alla quarta nelle situazioni più anticipate. La fenologia media attuale risulta attestata sulla 2° età prevalente.

In media dunque, lo stadio fenologico attuale dell’insetto è quello di 2° età prevalente, pressappoco in linea con lo scorso anno, ma più scalare tra i vari ambienti.



Altre cicaline (*Erasmoneura vulnerata*, *Empoasca vitis*, *Zygina rhamni*): In vigneto si osservano le forme giovanili (neanidi e ninfe) e la presenza dei primi adulti di prima generazione.

Fillominatori (*Phyllocnistis vitegenella*, *Antispila oinophylla*, *Holocacista rivellei*): Sporadica presenza in vigneto. In questa fase si conferma la presenza delle larve di *Antispila* in piena attività all’interno della lamina fogliare.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*): In vigneto si conferma la presenza sporadica degli adulti specialmente lungo il perimetro degli appezzamenti, la schiusura delle uova con la presenza delle prime neanidi sulle foglie basali dei germogli e dei polloni, ove ancora presenti.

Tripidi (*Drepanothrips reuteri*): Si segnala la presenza sporadica soprattutto nei giovani impianti.

Virosi e Fitoplasmi (Viroso del Pinot grigio - GPGV, Flavescenza dorata – FD, Legno nero - LN): Continuano le segnalazioni di comparsa di sintomatologie da FD sulle viti già infettate lo scorso anno, così come quelli della virosi GPGV su Glera, Garganega, Chardonnay e Pinot grigio.




Foto: Peronospora su foglia (a sx e al centro; *Extenda vitis*); Danni da grandine (a dx; F. Bonomi)



Foto: Larva matura (L5) e crisalide di Tignoletta su grappolo (a sx e centro-sx); Catture di maschi di Tignoletta (al centro-dx); Larva matura (L5) di Eulia (a dx) (foto di E. Marchesini)



Foto: Neanide di prima (a sx), seconda (al centro-sx) e terza età (a centro-dx) di *S. titanus*; Uova e neanidi di *P. corni* (Foto di E. Marchesini)



Ovatura di cimice asiatica (a sx; foto di D. Fornasiero); Larva di *Antispilla* su foglia (a centro-sx; foto di *Extenda vitis*); Danni da tripidi su foglia (centro-dx; foto di *Extenda vitis*); Forma apoplettica di Mal dell'Esca (a dx; foto di *Extenda vitis*)

### Indirizzi di difesa:

In tutti i comprensori viticoli, in seguito alle precipitazioni degli ultimi giorni associati ad un'ampia escursione termica e in previsione dei prossimi eventi temporaleschi attualmente previsti per i prossimi giorni della settimana corrente, è necessario valutare la tempestiva ricopertura antiperonosporica ed antiodica. Particolare attenzione va posta laddove i vigneti sono stati colpiti dagli eventi grandinigeni, al fine di favorire la cicatrizzazione delle ferite, e dove si sono verificati quantitativi di pioggia abbondanti. Le



valutazioni delle sostanze attive da impiegare devono tenere conto delle strategie di difesa aziendali prescelte.

Si consiglia, in generale, di impiegare le usuali sostanze attive di contatto (es. folpet/rame + zolfo liquido/bagnabile) eventualmente addizionate di formulati endoterapici-sistemici in quelle situazioni in cui sono già state osservate le prime infezioni o negli areali storicamente più sensibili.

**Botrite (*Botrytis cinerea*):** Nei vigneti e varietà più sensibili allo sviluppo del patogeno si suggerisce di valutare un intervento mediante l'impiego di sostanze attive specifiche. Si ricorda che le buone pratiche agronomiche di sfogliatura e cimatura, utili all'arieggiamento del grappolo e della chioma, potrebbero contribuire a sfavorire lo sviluppo del patogeno.

**Tignoletta (*Lobesia botrana*):** In questa fase non sono previsti interventi specifici.

**Cocciniglie (*Planococcus ficus*, *Pseudococcus comstocki* e *Parthenolecanium corni*):** In questa fase non sono previsti interventi specifici.

**Altre cicaline (*Erasmoneura vulnerata*, *Empoasca vitis*, *Zygina rhamnii*):** I trattamenti insetticidi obbligatori previsti contro la cicalina *Scaphoideus titanus* secondo disposizione regionale potrebbero agire efficacemente anche contro le altre cicaline in vigneto, tuttavia in caso di forti infestazioni e al superamento delle soglie di intervento si può programmare un intervento mirato e con l'utilizzo di insetticidi specifici.

**Viroso e Fitoplasm (Viroso del Pinot grigio - GPGV, Flavescenza dorata – FD, Legno nero - LN):** Le viti che presentano sintomi da Giallumi (FD e LN) devono essere rapidamente estirpate, come stabilito dal vigente Decreto di Lotta Obbligatoria contro la Flavescenza dorata. In caso di dubbi di riconoscimento, fare riferimento alle foto contenute nella Guida divulgativa "I Giallumi della vite in Veneto", reperibile nel sito istituzionale dell'UO Fitosanitario: <https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/home>

## Lotta Obbligatoria contro Flavescenza dorata

In base ai dati raccolti e agli sviluppi attesi, di concerto con i Referenti scientifici della Regione (Dafnae-UniPD, DB-Univr e Crea VE), sono state definite anche le Finestre di Intervento Regionale per la lotta insetticida obbligatoria nelle realtà in gestione integrata, volontaria e obbligatoria, che devono eseguire 2 interventi ai sensi del DDir n.13645 del 14 maggio 2026 (vigneti nei quali si impiegano esclusivamente sostanze attive ammesse di sintesi).

La prima finestra va dall' 8 al 19 giugno compresi e la seconda entro 10-15 giorni dal primo trattamento.

| FINESTRE di INTERVENTO REGIONALI PER I TRATTAMENTI OBBLIGATORI<br>CONTRO SCAPHOIDEUS TITANUS |                                                                |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Vigneti in gestione integrata<br>con 2 trattamenti obbligatori | Vigneti in gestione biologica (RegUE 2018/848)<br>e mista con 3 trattamenti obbligatori |
| 1°                                                                                           | Dall' 8 al 19 giugno 2026                                      | Dall' 1 all' 11 giugno 2026                                                             |
| 2°                                                                                           | a 10-15 gg dal 1° trattamento                                  | a 7-12 gg dal 1° trattamento                                                            |
| 3°                                                                                           | --                                                             | a 7-12 gg dal 2° trattamento                                                            |

### Attenzione:

- 1) Il primo trattamento, in ogni caso, deve essere eseguito solo dopo la fine della fase fiorale.
- 2) Il rispetto delle Finestre di Intervento Regionali e del numero di trattamenti da eseguire è vincolante ai fini degli obblighi di lotta contro lo *Scaphoideus titanus*.
- 3) Si consiglia di prendere visione e seguire i suggerimenti contenuti nei Bollettini di difesa integrata della vite elaborati e diffusi dai Servizi tecnici comprensoriali, i quali, in base ai propri dati di monitoraggio



locale, possono centrare il periodo di esecuzione del 1° trattamento per il territorio di riferimento, comunque entro i limiti della Finestra di Intervento Regionale stabilita dall'UO Fitosanitario.

- 4) Si raccomanda la massima diligenza operativa verso tutte le disposizioni dell'Allegato D del DDir n. 13645 del 14 maggio 2026 "Modalità di preparazione ed esecuzione dei trattamenti obbligatori" richiamate nella tabella sottostante.

**MODALITÀ DI PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI OBBLIGATORI**

| PRIMA DELL'INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IN PREPARAZIONE E DURANTE L'INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>ü Riordinare le masse verdi (cimare i germogli ricadenti o a terra e sfoltirli laddove sono troppo fitti e/o pressati dentro i fili di contenimento) per consentire che la soluzione insetticida giunga al meglio all'interno della chioma.</li><li>ü Sospendere le operazioni di riordino delle masse vegetative e di spollonatura almeno 2-3 giorni prima dell'intervento, per consentire la risalita sulle viti dei giovani di <i>Scaphoideus</i> caduti a terra durante l'esecuzione delle stesse.</li><li>ü Sfalciare o trinciare il cotico erboso 2-3 giorni prima dell'intervento, eliminarlo o attendere la sua completa essiccazione prima di effettuare il trattamento.</li><li>ü Verificare la taratura e il buon funzionamento dell'attrezzatura di distribuzione in uso.</li><li>ü Verificare le disposizioni vigenti del Comune di appartenenza, in particolare quelle previste dai Regolamenti di Polizia Rurale e per le Aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ü Rispettare le prescrizioni di etichetta del prodotto da impiegare.</li><li>ü Correggere a necessità il pH e la durezza dell'acqua di soluzione.</li><li>ü Non aggiungere fungicidi o altro, in ogni caso evitare miscele di più formulati anche se compatibili.</li><li>ü Trattare verso sera/notte se possibile, o comunque nelle ore più fresche del giorno, quando si impiegano prodotti foto/termolabili come ad esempio il piretro.</li><li>ü Bagnare adeguatamente tutti i filari e tutta la vegetazione da ambo i lati, compresi i polloni e i ricacci lungo il fusto se presenti, impiegando volumi di acqua in ogni caso superiori ai 400 lt/ettaro. Si consiglia di verificare la qualità della distribuzione con le apposite cartine idrosensibili.</li></ul> |

- 5) Si raccomanda di evitare l'esecuzione dei trattamenti nei giorni festivi per non creare disagi alla popolazione nelle aree di prossimità, per quanto possibile.
- 6) Si esortano tutti i viticoltori ad eseguire le strategie di lotta raccomandate dall'UO Fitosanitario specificate al p.to 6 del DDir n. 13645 del 14 maggio 2026, richiamate nella tabella sottostante.

**STRATEGIE DI LOTTA RACCOMANDATE E SOSTANZE ATTIVE AMMESSE**

| Interventi | Vigneti in gestione integrata con 2 trattamenti obbligatori                                                              | Vigneti in gestione biologica (Reg. UE 2018/848) e mista con 3 trattamenti obbligatori                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1°         | Acetamiprid, Deltametrina, Esfenvalerate, Etofenprox, Flupyradifurone, Lambda-cialotrina, Sulfoxaflor o Tau-fluvalinate. | Azadiractina, <i>Beauveria bassiana</i> , Olio essenziale di arancio, Maltodestrina, Sali potassici di acidi grassi o Silicato di Alluminio. |
| 2°         | Deltametrina, Esfenvalerate, Etofenprox, Lambda-cialotrina o Tau-fluvalinate                                             | Piretrine                                                                                                                                    |
| 3°         | -----<br>-                                                                                                               | Piretrine                                                                                                                                    |

Nota bene: Nelle fasce di rispetto dai corpi idrici, dalle piante e dagli artropodi non bersaglio, è raccomandato l'impiego del silicato di alluminio (caolino calcinato).

In ogni caso devono essere rispettate le distanze minime a tutela delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e dalle abitazioni secondo le disposizioni della DGR Veneto 1082/2019 così come recepite dai Regolamenti comunali in materia.

Inoltre devono essere rispettate, da parte di tutti coloro che beneficiano degli aiuti PAC, le misure ambientali della Condizionalità rafforzata (BCAA4) a protezione delle acque superficiali e sotterranee.




- 7) Si consiglia a tutti coloro che non sono in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) di rivolgersi a dei terzisti abilitati per la realizzazione dei trattamenti obbligatori.

**NOTA INFORMATIVA:**

- Il DDir n. 13645 del 14 maggio 2026 "Misure di Lotta Obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2026" e il Testo Consolidato con l'aggiornamento di aprile delle Linee Tecniche di Produzione Integrata sono pubblicati nel sito istituzionale dell'UO Fitosanitario: (<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/home>).
- Si riporta a seguire una lista dei prodotti fitosanitari ammessi per la lotta obbligatoria. Tale lista ha carattere meramente informativo e non esaustivo dei formulati disponibili in commercio allo scopo. Si fa presente inoltre che ogni utilizzatore di prodotti fitosanitari è tenuto a verificare l'etichetta aggiornata alla data di impiego, consultabile nella Banca dati fitosanitari del Ministero della Salute: [https://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws\\_new/FitosanitariServlet](https://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet)

Altre indicazioni: Negli allevamenti in parete, dopo il completamento della pulizia della vegetazione avventizia sulle teste e lungo il fusto è necessario procedere rapidamente all'operazione di palizzamento per assicurare entro i fili di coppia i germogli sviluppati che tendono verso il basso e al centro dell'interfila; al contempo si fa attenzione a riordinare e distribuire i germogli per evitare gli affastellamenti e garantire così una migliore copertura dei trattamenti sulla superficie fogliare. Nelle varietà in cui è terminata la fioritura è possibile effettuare la cimatura dei germogli e la defogliazione in fascia grappoli, al fine di garantire una maggiore pulizia di questi dai residui florali, migliorare le condizioni microclimatiche della parete vegetativa in previsione di una maggiore efficacia dei trattamenti anti-botritici e insetticidi.

DF




Modello Peronospora RIMPro: grafici del rischio infettivo stimato a Ronco all'Adige e a Montecchia di Crosara - VR (G. Posenato).




rimpro

Grape Powdery Mildew ASA PERGOLA - 2026



rimpro


Grape Powdery Mildew VIGNETO BRENTON - 2026



Modello Oidio RIMPro: grafici del rischio stimato a Montecchia di Crosara e a Brenton di Roncà - VR (G. Posenato).

rimpro

RIMpro Guignardie ASA - 2026



Modello Black rot RIMPro: grafici del rischio stimato a Montecchia di Corsara - VR (G. Posenato).



**Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive ammesse dal Decreto di Lotta Obbligatoria 2026 registrati per l'impiego su Vite contro "Scaphoideus titanus" e/o contro "Cicaline"**

elaborazione su dataset BDF srl dei PF a catalogo al 5 maggio 2026



| Prodotto Fitosanitario      | Sostanza attiva                                 | Bio | Avversità registrate  | Note PF art.53 Reg (CE) 1107/2009     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------------------------|
| ABANTO                      | Piretrine (40 g/l)                              | Si  | Scaphoideus, Cicaline |                                       |
| ASSET DUO                   | Piretrine (18,61 g/l)                           | Si  | Scaphoideus           |                                       |
| ASSET FIVE                  | Piretrine (46,5 g/l)                            | Si  | Cicaline              |                                       |
| ATLAS                       | Lambda-cialotrina (100 g/l)                     | No  | Cicaline              |                                       |
| AUDACE SC                   | Deltametrina (15,7 g/l)                         | No  | Cicaline              |                                       |
| BEMOTIUS                    | Azadiractina (26 g/l)                           | Si  | Scaphoideus, Cicaline |                                       |
| BIOPIREN PLUS               | Piretrine (18,61 g/l)                           | Si  | Scaphoideus           |                                       |
| BIOVIS                      | Piretrine (18,61 g/l)                           | Si  | Scaphoideus           |                                       |
| CELL                        | Deltametrina (25 g/l)                           | No  | Cicaline              |                                       |
| CLOSER                      | Sulfoxaflor (120 g/l)                           | No  | Scaphoideus           | impiego consentito fino al 28/08/2026 |
| CORDOBA                     | Lambda-cialotrina (100 g/l)                     | No  | Cicaline              |                                       |
| DECIS EVO                   | Deltametrina (25 g/l)                           | No  | Scaphoideus           |                                       |
| DELTAGRI                    | Deltametrina (25 g/l)                           | No  | Scaphoideus           |                                       |
| DELTAMIX 25                 | Deltametrina (25 g/l)                           | No  | Cicaline              |                                       |
| DELTASAP                    | Deltametrina (25 g/l)                           | No  | Cicaline              |                                       |
| DELTA SEC                   | Deltametrina (25 g/l)                           | No  | Cicaline              |                                       |
| DEMETRINA FLOW              | Deltametrina (15,7 g/l)                         | No  | Cicaline              |                                       |
| DISHA                       | Deltametrina (25 g/l)                           | No  | Cicaline              |                                       |
| EPIK SL                     | Acetamiprid (50 g/l)                            | No  | Scaphoideus           |                                       |
| ERADICOAT MAX               | Maltodestrina (40%)                             | Si  | Scaphoideus           |                                       |
| ESSEN'CIEL                  | Olio di arancio (60 g/l)                        | Si  | Cicaline              |                                       |
| EVURE PRO                   | Tau-fluvalinate (240 g/l)                       | No  | Scaphoideus           |                                       |
| FLIPPER                     | Sali di potassio degli acidi grassi (479,8 g/l) | Si  | Cicaline              |                                       |
| FORZA                       | Lambda-cialotrina (2,5%)                        | No  | Cicaline              |                                       |
| GLORIAL 25 EC               | Deltametrina (25 g/l)                           | No  | Scaphoideus           |                                       |
| JUDO                        | Lambda-cialotrina (100 g/l)                     | No  | Cicaline              |                                       |
| KAIMO SORBIE                | Lambda-cialotrina (5%)                          | No  | Scaphoideus           |                                       |
| KARAKAS                     | Lambda-cialotrina (100 g/l)                     | No  | Cicaline              |                                       |
| KARATE ZEON                 | Lambda-cialotrina (100 g/l)                     | No  | Cicaline              |                                       |
| KARATE ZEON 1.5             | Lambda-cialotrina (15 g/l)                      | No  | Cicaline              |                                       |
| KEMPO SORBIE                | Lambda-cialotrina (5%)                          | No  | Scaphoideus           |                                       |
| KESTREL                     | Acetamiprid (200 g/l)                           | No  | Scaphoideus           |                                       |
| LAMDEX EXTRA                | Lambda-cialotrina (2,5%)                        | No  | Cicaline              |                                       |
| LIMOCIDE                    | Olio di arancio (60 g/l)                        | Si  | Cicaline              |                                       |
| LINCE                       | Piretrine (40 g/l)                              | Si  | Scaphoideus, Cicaline |                                       |
| LUMIX BIO                   | Piretrine (40 g/l)                              | Si  | Scaphoideus, Cicaline |                                       |
| MARKATE PLUS 100 CS         | Lambda-cialotrina (100 g/l)                     | No  | Cicaline              |                                       |
| MAVRIK SMART                | Tau-fluvalinate (240 g/l)                       | No  | Scaphoideus           |                                       |
| METEOR                      | Deltametrina (15,7 g/l)                         | No  | Cicaline              |                                       |
| NATUR BREAKER               | Piretrine (40 g/l)                              | Si  | Scaphoideus, Cicaline |                                       |
| NATURALIS                   | Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 (0,01%)     | Si  | Scaphoideus           |                                       |
| NEEMAZAL-T/S                | Azadiractina (10 g/l)                           | Si  | Cicaline              |                                       |
| NEEMIK TEN                  | Azadiractina (10 g/l)                           | Si  | Cicaline              |                                       |
| NINJA                       | Lambda-cialotrina (2,5%)                        | No  | Cicaline              |                                       |
| NINJA L                     | Lambda-cialotrina (15 g/l)                      | No  | Cicaline              |                                       |
| OIKOS                       | Azadiractina (26 g/l)                           | Si  | Cicaline              |                                       |
| OIKOS TOP                   | Azadiractina (10 g/l)                           | Si  | Cicaline              |                                       |
| ORO-QUIN                    | Olio di arancio (60 g/l)                        | Si  | Cicaline              |                                       |
| PIRECRIS                    | Piretrine (20 g/l)                              | Si  | Scaphoideus           |                                       |
| PIREFLOR                    | Piretrine (18 g/l)                              | Si  | Scaphoideus           |                                       |
| PIRETRO ACTIGREEN           | Piretrine (18,61 g/l)                           | Si  | Scaphoideus           |                                       |
| PIRETRO NATURA              | Piretrine (40 g/l)                              | Si  | Scaphoideus, Cicaline |                                       |
| PIRETRO VERDE               | Piretrine (18,61 g/l)                           | Si  | Scaphoideus           |                                       |
| POLECI                      | Deltametrina (25 g/l)                           | No  | Cicaline              |                                       |
| PREV-AM PLUS                | Olio di arancio (60 g/l)                        | Si  | Cicaline              |                                       |
| PYREGARD                    | Piretrine (40 g/l)                              | Si  | Scaphoideus, Cicaline |                                       |
| RABONA                      | Piretrine (46,5 g/l)                            | Si  | Cicaline              |                                       |
| RAVANE PLUS 100 CS          | Lambda-cialotrina (100 g/l)                     | No  | Cicaline              |                                       |
| SHUNTA                      | Piretrine (40 g/l)                              | Si  | Scaphoideus, Cicaline |                                       |
| SINALA                      | Olio di arancio (60 g/l)                        | Si  | Cicaline              |                                       |
| SIVANTO PRIME               | Flupyradifurone (200 g/l)                       | No  | Scaphoideus           |                                       |
| SUMIALFA ECHO               | Esfenvalerate (15 g/l)                          | No  | Cicaline              |                                       |
| SUPER DELTA                 | Deltametrina (25 g/l)                           | No  | Cicaline              |                                       |
| SURROUND WP CROP PROTECTANT | Silicato di alluminio (caolino) (95%)           | Si  | Scaphoideus           | impiego consentito fino al 29/07/2026 |
| TERSUS                      | Piretrine (12,9 g/l)                            | Si  | Scaphoideus           |                                       |
| TREBON UP                   | Etofenprox (287,5 g/l)                          | No  | Scaphoideus           |                                       |